

ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ ЦЕПОЧКИ ВОЛЬТЕРРА С АСИМПТОТИЧЕСКИ ПЕРИОДИЧЕСКИМ НАЧАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ

Аг. Х. Ханмамедов

Аннотация. Рассмотрена задача Коши для полубесконечной цепочки Вольтерра с асимптотически периодическим начальным условием. Изучен вопрос существования решения, имеющего ту же асимптотику на бесконечности, что и начальное условие. Показана возможность применения метода обратной задачи рассеяния к рассматриваемой задаче.

Ключевые слова: цепочка Вольтерра, задача рассеяния, асимптотически периодическое условие, метод обратной задачи, задача Коши, глобальная разрешимость.

1. Введение. Многие интересные физические явления описываются бесконечными динамическими системами такими, как цепочка Вольтерра, цепочка Тоды и т. д. (см. [1–13]). Хорошо известно, что метод обратной задачи рассеяния (МОЗР) позволяет детально исследовать задачу Коши для упомянутых цепочек в случае быстро убывающих начальных условий [1–3, 5, 8, 14] и в периодическом случае [6–8]. С практической точки зрения интерес представляет также задача Коши с асимптотически периодическим начальным условием. При этом возникает вопрос о возвращении динамической системы к своему начальному состоянию на больших расстояниях (см. [9]).

Для последовательности положительных функций $a_n = a_n(t) > 0$, $a_n \in C^{(1)}[0, \infty)$, рассмотрим следующую задачу для цепочки Вольтерра:

$$\dot{a}_n = \frac{1}{2}a_n(a_{n-1}^2 - a_{n+1}^2), \quad n = 1, 2, \dots, \quad (1.1)$$

$$a_n(0) - \hat{a}_n \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty, \quad (1.2)$$

$$a_0 = 0, \quad (1.3)$$

где $\hat{a}_{n+N} = \hat{a}_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$, N — натуральное число, а точкой сверху здесь и далее обозначается производная по t .

Будем искать такое решение $a_n(t)$ задачи (1.1)–(1.3), что $a_n(t) - \hat{a}_n$ быстро убывает, т. е. при любом $T > 0$ выполняется условие

$$\|Q_1(T)\|_{C[0,T]} < \infty, \quad (1.4)$$

где $Q_r(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n|a_n(t) - \hat{a}_n|$, $r = 1$ (или $r = 3$).

Настоящая работа посвящена изучению задачи (1.1)–(1.3) в классе (1.4). Показана возможность применения МОЗР к задаче (1.1)–(1.3) при $N \leq 2$. При

этом для начальных условий, имеющих конечный третий момент, дано обоснование МОЗР, которое обеспечивает глобальную разрешимость задачи (1.1)–(1.3) в классе (1.4). Доказана также теорема об отсутствии решения. Отметим, что в случае некоторых цепочек, связанных с изоспектральными деформациями якобиевых матриц, вопрос о глобальной разрешимости исследован в [8, 11] для более широких классов начальных условий. Однако предложенный в данной статье метод может быть использован также в неизоспектральном случае (см. [12]). Заметим, что задача Коши для бесконечной в обе стороны цепочки Вольтерра с асимптотически периодическим условием (с периодом 2) поставлена в работе [9]. Эта задача полностью решена в работе [10]. Тем не менее исследование полубесконечной цепочки по сравнению с бесконечной в обе стороны цепочки сталкивается с трудностями. Особенно эти трудности усугубляются в вопросе обоснования МОЗР, так как здесь придется «разумно переопределить» второй оператор $L - A$ пары, описывающий эволюцию во времени собственных функций вспомогательной спектральной задачи.

В дальнейшем рассмотрении мы исключим случай $N = 1$, считая при этом, что последний получается из общего случая при $N = 2$ и $\hat{a}_0 = \hat{a}_1$.

2. Предварительные сведения. В этом разделе сформулируем некоторые вспомогательные факты, относящиеся к краевой задаче рассеяния для разностного уравнения второго порядка, многие из которых содержатся в работах [14, 15].

Рассмотрим граничную задачу

$$a_{n-1}y_{n-1} + a_n y_{n+1} = \lambda y_n, \quad n = 1, 2, \dots, \quad a_0 = \hat{a}_0, \quad (2.1)$$

$$y_0 = 0, \quad (2.2)$$

в которой коэффициент $a_n > 0$ удовлетворяет условию

$$\sum_{n=1}^{\infty} n|a_n - \hat{a}_n| < \infty, \quad (2.3)$$

где $\hat{a}_{n+2} = \hat{a}_n > 0$, $n = 0, 1, \dots$.

Пусть Γ — комплексная λ -плоскость с разрезами по отрезкам $[-|\hat{a}_0 + \hat{a}_1|, -|\hat{a}_0 - \hat{a}_1|]$ и $[|\hat{a}_0 - \hat{a}_1|, |\hat{a}_0 + \hat{a}_1|]$, а $\partial\Gamma$ — ее «граница», состоящая из точек верхнего и нижнего разрезов упомянутых отрезков. В плоскости Γ рассмотрим функцию

$$z = z(\lambda) = \frac{\lambda^2 - \hat{a}_0^2 - \hat{a}_1^2}{2\hat{a}_0\hat{a}_1} + \sqrt{\left(\frac{\lambda^2 - \hat{a}_0^2 - \hat{a}_1^2}{2\hat{a}_0\hat{a}_1}\right)^2 - 1},$$

где регулярная ветвь радикала выбирается из условия $\sqrt{\left(\frac{\lambda^2 - \hat{a}_0^2 - \hat{a}_1^2}{2\hat{a}_0\hat{a}_1}\right)^2 - 1} < 0$ при $\lambda > \hat{a}_0 + \hat{a}_1$. Отметим, что

$$y_{2n+1-j} = \left(\frac{\hat{a}_0 z(\lambda) + \hat{a}_1}{\lambda}\right)^{j-2}, \quad j = 1, 2,$$

служит решением Флоке (см. [8]) уравнения (2.1) при $a_n = \hat{a}_n$, а $z(\lambda)$ — мультипликатор Флоке.

В дальнейшем мы часто будем опускать зависимость функции $z(\lambda)$ от λ . Таким образом, в формулах, где участвуют z и λ , всегда подразумевается, что z является введенной функцией λ .

Обозначим через $f_n(\lambda)$ решение уравнения (2.1), удовлетворяющее условиям

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_{2n+1-j}(\lambda) \left(\frac{\hat{a}_0 z + \hat{a}_1}{\lambda} \right)^{j-2} = 1, \quad j = 1, 2.$$

Такое решение существует и определяется однозначно. Справедливо [14, 15] представление через оператор преобразования

$$f_{2n+1-j}(\lambda) = \alpha_j(n) \left(\frac{\hat{a}_0 z + \hat{a}_1}{\lambda} \right)^{2-j} z^n \left\{ 1 + \sum_{m=1}^{\infty} K_j(n, m) z^m \right\}, \quad j = 1, 2, \quad n \geq j-1, \quad (2.4)$$

причем

$$\alpha_j(n) = 1 + o(1), \quad n \rightarrow \infty, \quad K_j(n, m) = O\left(\sum_{r=n+[\frac{m}{2}]} |a_r - \hat{a}_r| \right), \quad n + m \rightarrow \infty,$$

где $[x]$ — целая часть x .

Величины $\alpha_j(n)$, $K_j(n, m)$ и коэффициент a_n уравнения (1.1) связаны соотношениями

$$\frac{a_{2n+1-j}}{\hat{a}_{j-1}} = \left(\frac{\alpha_2(n+2-j)}{\alpha_1(n)} \right)^{1-2[\frac{j}{2}]}, \quad j = 1, 2, \quad n \geq j-1, \quad (2.5)$$

$$\frac{a_{2n+1-j}^2 - \hat{a}_{j-1}^2}{\hat{a}_0 \hat{a}_1} = \left(1 - 2 \left[\frac{j}{2} \right] \right) \left\{ K_1 \left(n - \left[\frac{j}{2} \right], 1 \right) - K_2(n, 1) \right\}, \quad j = 1, 2, \quad n \geq 1, \quad (2.6)$$

$$K_2(n, m+1) - K_1(n, m+1) = \frac{\hat{a}_0}{\hat{a}_1} K_1(n, m) - \frac{a_{2n}^2}{\hat{a}_0 \hat{a}_1} K_2(n+1, m), \quad n \geq 1, \quad (2.7)$$

$$K_1(n-1, m+1) - K_2(n, m+1) = \frac{\hat{a}_1}{\hat{a}_0} K_2(n, m) - \frac{a_{2n-1}^2}{\hat{a}_0 \hat{a}_1} K_1(n, m), \quad n \geq 1, \quad m \geq 1. \quad (2.8)$$

Определим решение $\varphi_n(\lambda)$ уравнения (2.1), удовлетворяющее условиям $\varphi_0(\lambda) \equiv 0$, $\varphi_1(\lambda) \equiv 1$. Тогда [15] верно соотношение

$$\frac{\hat{a}_1(z^{-1} - z)}{\lambda} \varphi_n(\lambda) = f_0(\lambda) \overline{f_n(\lambda)} - \overline{f_0(\lambda)} f_n(\lambda), \quad \lambda \in \partial\Gamma, \quad \lambda^2 \neq (\hat{a}_0 + \hat{a}_1)^2. \quad (2.9)$$

Функция $f_0(\lambda)$ регулярна в плоскости Γ (за исключением точки $\lambda = 0$ при $\hat{a}_0 < \hat{a}_1$) и может иметь конечное число простых вещественных нулей λ_k , $k = 1, \dots, N_0$, лежащих вне $\partial\Gamma$ (см. [15]). При этом собственные значения оператора L , порожденного в пространстве $\ell_2[1, \infty)$ граничной задачей (2.1), (2.2), являются простыми и совпадают с нулями λ_k , $k = 1, \dots, N_0$.

Введем обозначения

$$S_0(\lambda) = \frac{\overline{f_0(\lambda)}}{f_0(\lambda)}, \quad M_j^{-1} = \|f_n(\lambda_j)\|_{\ell_2[1, \infty)}, \quad j = 1, \dots, N_0.$$

Как показано в [15], векторы $\{u_n(\lambda)\}_{n=1}^{\infty}$, $\{u_n(\lambda_j)\}_{n=1}^{\infty}$, определенные по формулам

$$u_n(\lambda) = \overline{f_n(\lambda)} - S_0(\lambda) f_n(\lambda), \quad \lambda \in \partial\Gamma, \quad u_n(\lambda_j) = M_j f_n(\lambda_j), \quad j = 1, \dots, N_0, \quad (2.10)$$

образуют полный набор нормированных собственных векторов оператора L , т. е. имеет место формула

$$\frac{1}{4\pi i} \int_{\partial\Gamma} \frac{\lambda}{\hat{a}_0 \hat{a}_1 (z - z^{-1})} u_n(\lambda) \overline{u_m(\lambda)} d\lambda + \sum_{j=1}^{N_0} u_n(\lambda_j) u_m(\lambda_j) = \delta_{nm}, \quad n, m = 1, 2, \dots, \tag{2.11}$$

где δ_{nm} — символ Кронекера.

Рассмотрим представление (2.4). Согласно этому представлению $f_0(\lambda)$ является нечетной функцией. Поэтому нули λ_j расположены симметрично относительно точки $\lambda = 0$, т. е. $\lambda_j = \pm\mu_j$, $\mu_j \geq 0$. Симметричным точкам λ_j отвечают равные нормировочные числа M_j . Положим $z_j = z(\mu_j)$, $j = 1, \dots, [\frac{N_0+1}{2}]$. Из определения функции $z(\lambda)$ следует, что числа z_j удовлетворяют неравенствам $0 < z_j^2 < 1$, $(\hat{a}_0 z_j + \hat{a}_1)(\hat{a}_0 z_j^{-1} + \hat{a}_1)^{-1} \geq 0$, причем равенство может достигаться в том и только в том случае, когда $\hat{a}_0 > \hat{a}_1$. В этом случае одно из чисел z_j равно $-\frac{\hat{a}_1}{\hat{a}_0}$.

Далее, согласно (2.4) коэффициент $S_0(\lambda) = \frac{\overline{f_0(\lambda)}}{f_0(\lambda)}$ можно рассматривать как функцию $S(z)$ от переменного z , причем

$$S(z(\lambda)) = S_0(\lambda). \tag{2.12}$$

Набор величин

$$\left\{ S(z), |z| = 1; z_j, 0 < z_j^2 < 1, (\hat{a}_0 z_j + \hat{a}_1)(\hat{a}_0 z_j^{-1} + \hat{a}_1)^{-1} \geq 0; M_j, M_j > 0, j = 1, \dots, [(N_0 + 1)/2] \right\} \tag{2.13}$$

назовем *данными рассеяния* для граничной задачи (2.1), (2.2). Обратная задача рассеяния для последней задачи состоит в восстановлении коэффициента a_n , $n \geq 1$, по данным рассеяния.

В [15] установлены характеристические свойства данных рассеяния, позволяющие по ним восстановить коэффициент a_n уравнения (2.1). Положим

$$F_j(n) = 2 \sum_{z_k \neq -\frac{\hat{a}_1}{\hat{a}_0}} M_k^2 \left(\frac{\hat{a}_0 z_k + \hat{a}_1}{\hat{a}_0 z_k^{-1} + \hat{a}_1} \right)^{2-j} z_k^n + M_k^2 \left(\frac{\hat{a}_0 z_k + \hat{a}_1}{\hat{a}_0 z_k^{-1} + \hat{a}_1} \right)^{2-j} z_k^n \Big|_{z_k = -\frac{\hat{a}_1}{\hat{a}_0}} - \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} S(z) \left(\frac{\hat{a}_0 z + \hat{a}_1}{\hat{a}_0 z^{-1} + \hat{a}_1} \right)^{2-j} z^{n-1} dz, \quad j = 1, 2, \tag{2.14}$$

причем второе слагаемое входит в (2.14) тогда и только тогда, когда $\hat{a}_0 > \hat{a}_1$.

Справедливо [15] следующее

Утверждение 1. *Для того чтобы набор величин (2.13) был данными рассеяния для некоторой граничной задачи (2.1), (2.2) с коэффициентом a_n из класса (2.3), необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие условия:*

(а) *функция $S(z)$ непрерывна на окружности $|z| = 1$ и*

$$\overline{S(z)} = S(1/z) = S^{-1}(z);$$

(б) $\sum_{n=1}^{\infty} n |F_2(n + 2p) - F_1(n)| < \infty, \quad p = 0, 1;$

(в) приращение $\Delta \arg S(z)$ аргумента функции $S(z)$ вдоль окружности $|z| = 1$ связано с числом N_0 формулой

$$\left[\frac{N_0 + 1}{2} \right] = -\frac{1}{4\pi} \Delta \arg S(z) - \frac{2 - S(1) - S(-1)}{4}.$$

При выполнении условий этого утверждения обратная задача рассеяния решается следующим образом. Сначала по данным рассеяния построим величину $F_j(n)$ по формуле (2.14). Тогда коэффициент a_n восстанавливается по любым из формул (2.5), (2.6), где величины $K_j(n, m)$ и $\alpha_j(n)$ находятся из соотношений

$$F_j(2n+m) + K_j(n, m) + \sum_{r=1}^{\infty} K_j(n, r) F_j(2n+m+r) = 0, \quad j = 1, 2, \quad n \geq j-1, \quad m \geq 1, \quad (2.15)$$

$$\alpha_j^{-2}(n) = 1 + F_j(2n) + \sum_{m=1}^{\infty} K_j(n, m) F_j(2n+m), \quad j = 1, 2, \quad n \geq 1, \quad (2.16)$$

первое из которых имеет при каждом n единственное решение в $\ell_p[1, \infty)$, $p = 1, 2$, относительно $K_j(n, m)$.

Уравнения (2.15) назовем *основными уравнениями типа Гельфанда – Левитана – Марченко*. Выведем некоторые оценки относительно решений основных уравнений. Заметим прежде всего, что при выполнении условий утверждения 1 уравнения (2.15) порождаются вполне непрерывными операторами в $\ell_1[1, \infty)$, т. е. оператор $\mathcal{F}_{j,n}$ ($j = 1, 2$), действующий по формуле $(\mathcal{F}_{j,n}y)_m = \sum_{k=1}^{\infty} F_j(2n+m+k)y_k$, вполне непрерывен в $\ell_1[1, \infty)$. Поскольку уравнения (2.15) при каждом n имеют единственные решения в $\ell_1[1, \infty)$, оператор $I + \mathcal{F}_{j,n}$ для каждого n имеет ограниченный обратный. Легко видеть, что этот обратный оператор ограничен в $\ell_1[1, \infty)$ по норме равномерно относительно n :

$$\|(I + \mathcal{F}_{j,n})^{-1}\| \leq C, \quad j = 1, 2, \quad n \geq j-1. \quad (2.17)$$

Положим $\sigma(n) = \sum_{m=n}^{\infty} \{|F_1(m) - F_2(m)| + |F_2(m+2) - F_1(m)|\}$. Представляя $F_j(n)$ в виде

$$F_j(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \{F_j(n+2k) - F_j(n+2(k+1))\},$$

находим, что

$$|F_j(n)| \leq \sigma(n), \quad j = 1, 2. \quad (2.18)$$

Кроме того, в силу основных уравнений (2.15) и оценок (2.17), (2.18) имеем

$$|K_j(n, m)| \leq C\sigma(2n+m), \quad j = 1, 2, \quad (2.19)$$

где через C , вообще говоря, обозначаются разные постоянные.

С другой стороны, из (2.15) получим

$$\begin{aligned} & K_2(n, m) - K_1(n-p, m) + \sum_{r=1}^{\infty} \{K_2(n, r) - K_1(n-p, r)\} F_2(2n+m+r) \\ & = F_1(2(n-p)+m) - F_2(2n+m) \\ & + \sum_{r=1}^{\infty} K_1(n-p, r) \{F_1(2(n-p)+m+r) - F_2(2n+m+r)\}, \quad p = 0, 1. \quad (2.20) \end{aligned}$$

Воспользовавшись оценками (2.17)–(2.19) и последним уравнением, находим, что

$$\|K_2(n, \cdot) - K_1(n - p, \cdot)\|_{\ell_1[1, \infty)} \leq C\sigma(2n - 2), \quad p = 0, 1.$$

Поэтому из уравнения (2.20), принимая во внимание (2.18), (2.19), имеем

$$|K_2(n, m) - K_1(n - p, m)| \leq |F_1(2(n - p) + m) - F_2(2n + m)| + C\sigma(2n - 2)\sigma(2n - 2 + m), \quad p = 0, 1. \quad (2.21)$$

3. Временная динамика данных рассеяния. Предположим теперь, что в уравнении (2.1) стоит коэффициент $a_n(t)$, $n \geq 1$, являющийся решением задачи (1.1)–(1.3) при $N = 2$. Установим, каким образом меняются данные рассеяния $\{S(z, t); z_k(t), M_k(t)\}$ во времени.

Теорема 1. Если в уравнении (2.1) с коэффициентом $a_n = a_n(t)$, $n \geq 1$, последний является решением задачи (1.1)–(1.3) при $N = 2$, то динамика данных рассеяния граничной задачи (2.1), (2.2) описывается формулами

$$S(z, t) = S(z, 0) \exp\{\hat{a}_0 \hat{a}_1 (z^{-1} - z)t\}, \quad z_k(t) = z_k(0) = z_k, \\ M_k^2(t) = M_k^2(0) \exp\{\hat{a}_0 \hat{a}_1 (z_k^{-1} - z_k)t\}, \quad k = 1, \dots, \left\lfloor \frac{N_0 + 1}{2} \right\rfloor. \quad (3.1)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вводим операторы $L = L(t)$ и $\mathcal{A} = \mathcal{A}(t)$, полагая

$$(Ly)_1 = a_1(t)y_1, \quad (Ly)_n = a_{n-1}(t)y_{n-1} + a_n(t)y_{n+1}, \quad n > 1, \\ (\mathcal{A}y)_j = -\frac{1}{2}a_j(t)a_{j+1}(t)y_{j+2}, \quad j = 1, 2, \\ (\mathcal{A}y)_n = \frac{1}{2}\{a_{n-2}(t)a_{n-1}(t)y_{n-2} - a_n(t)a_{n+1}(t)y_{n+2}\}, \quad n > 2.$$

Операторы L и \mathcal{A} при каждом t являются соответственно симметрическим и кососимметрическим в $\ell_2[1, \infty)$: $L^* = L$, $\mathcal{A}^* = -\mathcal{A}$. Более того, эти операторы образуют пару Лакса и соотношение

$$\dot{L} = \mathcal{A}L - L\mathcal{A} \quad (3.2)$$

равносильно уравнению (1.1) с учетом краевого условия (1.3). Из последнего уравнения вытекает, что оператор $B = \frac{d}{dt} - \mathcal{A}$ переводит дифференцируемые по t решения уравнения $L\psi = \lambda\psi$ в решения этого же уравнения.

Рассмотрим тождество (2.9) с параметром t . Очевидно, что $\varphi = \{\varphi_n(\lambda, t)\}_{n=1}^\infty$ является дифференцируемым по t решением уравнения $L\varphi = \lambda\varphi$. Кроме того, $(B\varphi)_1 = \frac{1}{2}a_1(t)a_2(t)\varphi_3(\lambda, t) = \frac{\lambda^2 - a_1^2(t)}{2}$, откуда следует, что

$$B\varphi = \frac{\lambda^2 - a_1^2(t)}{2}\varphi. \quad (3.3)$$

С другой стороны, используя (2.4), (2.9), при $n \rightarrow \infty$ находим

$$\frac{\hat{a}_1(z^{-1} - z)}{\lambda}(B\varphi)_{2n+1-j} = \left\{ \dot{f}_0(\lambda, t) + \frac{1}{2}\hat{a}_0\hat{a}_1(z^{-1} - z)f_0(\lambda, t) \right\} \left(\frac{\hat{a}_0 z^{-1} + \hat{a}_1}{\lambda} \right)^{2-j} z^{-n} - \left\{ \overline{\dot{f}_0(\lambda, t)} - \frac{1}{2}\hat{a}_0\hat{a}_1(z^{-1} - z)\overline{f_0(\lambda, t)} \right\} \left(\frac{\hat{a}_0 z + \hat{a}_1}{\lambda} \right)^{2-j} z^n + o(1), \quad j = 1, 2.$$

Однако уравнение $L\psi = \lambda\psi$ имеет единственное решение с такой асимптотикой. Следовательно,

$$\frac{\hat{a}_1(z^{-1} - z)}{\lambda}(B\varphi)_n = \left\{ \dot{f}_0(\lambda, t) + \frac{1}{2}\hat{a}_0\hat{a}_1(z^{-1} - z)f_0(\lambda, t) \right\} \overline{f_n(\lambda, t)} - \left\{ \overline{\dot{f}_0(\lambda, t)} - \frac{1}{2}\hat{a}_0\hat{a}_1(z^{-1} - z)\overline{f_0(\lambda, t)} \right\} f_n(\lambda, t).$$

Подставим (3.3) в последнее равенство и сравним с тождеством (2.9). В результате получим

$$f_0(\lambda, t) = \frac{1}{2}\{\lambda^2 - a_1^2(t) - \hat{a}_0\hat{a}_1(z^{-1} - z)\}f_0(\lambda, t),$$

откуда вытекает первое из соотношений (3.1). Кроме того, в силу последнего уравнения имеем

$$f_0(\lambda, t) = f_0(\lambda, 0) \exp \left\{ \frac{1}{2}(\lambda^2 - \hat{a}_0\hat{a}_1(z^{-1} - z))t - \frac{1}{2} \int_0^t a_1^2(\tau) d\tau \right\},$$

стало быть, нули $\pm\mu_k(t)$ функции $f_0(\lambda, t)$ от t не зависят. Отсюда следует, что числа $z_k(t) = z(\mu_k(t))$ тоже не зависят от t : $z_k(t) = z_k(0) = z_k$.

Для получения динамики нормировок $M_k(t)$ рассмотрим собственную функцию $u^{(k)}(t) = \{u_n(\mu_k, t)\}_{n=1}^\infty$, $u_n(\mu_k, t) = M_k(t)f_n(\mu_k, t)$, оператора L , соответствующую собственному значению μ_k . Так как собственные значения этого оператора простые, то

$$\dot{u}^{(k)}(t) - \mathcal{A}u^{(k)}(t) = Cu^{(k)}(t).$$

Умножив обе части последнего равенства скалярно в $\ell_2[1, \infty)$ на $u^{(k)}(t)$ и воспользовавшись тем, что $u^{(k)}(t)$ — нормированная собственная функция, \mathcal{A} — кососимметрический оператор, получим $C = 0$. Следовательно, $Bu^{(k)}(t) = 0$.

С другой стороны, при $n \rightarrow \infty$

$$(Bu^{(k)}(t))_{2n+1-j} = \left\{ \dot{M}_k(t) - \frac{1}{2}\hat{a}_0\hat{a}_1(z_k^{-1} - z_k)M_k(t) \right\} \left(\frac{\hat{a}_0z + \hat{a}_1}{\lambda} \right)^{2-j} z^n \Big|_{\lambda=\mu_k} + o(z_k^n),$$

поэтому

$$\dot{M}_k(t) - \frac{1}{2}\hat{a}_0\hat{a}_1(z_k^{-1} - z_k)M_k(t) = 0,$$

откуда следует справедливость последних тождеств из (3.1). Теорема доказана.

Найденная временная динамика данных рассеяния позволяет найти решение задачи (1.1)–(1.3). Для этого нужно найти данные рассеяния при $t = 0$, затем построить функции $F_j(n, t)$ по формулам (2.15), в которых вместо $S(z, 0)$, $M_k^2(0)$ надо использовать (3.1). Далее следует решить уравнения (2.1) с параметром t относительно $K_j(n, m, t)$ и найти $a_n(t)$ по любым из формул (2.5), (2.6) (при включении параметра t).

4. Обоснование МОЗР. Однозначная разрешимость задачи (1.1)–(1.3) при $N = 2$. Описанной в разд. 3 схеме построения решения задачи (1.1)–(1.3) предполагается, что такое решение существует. От последнего предположения можно избавиться, убедившись, что упомянутая схема действительно приводит к решению задачи (1.1)–(1.3).

Пусть выполняется условие $Q_3(0) < \infty$. Вначале докажем, что в этом случае функции $a_n(t) - \hat{a}_n$ и $\dot{a}_n(t)$ быстро убывают. С этой целью используем основные уравнения (2.15) (при включении параметра t). Заметим прежде всего, что в силу формул (2.14), (3.1) ядра $F_j(n, t)$ этих уравнений непрерывно дифференцируемы по t и

$$\dot{F}_j(n, t) = \hat{a}_0 \hat{a}_1 \{F_j(n-1, t) - F_j(n+1, t)\}, \quad j = 1, 2. \quad (4.1)$$

С другой стороны, при условии $Q_3(0) < \infty$ функция $S(z, 0)$ дважды непрерывно дифференцируема на единичной окружности. Тогда, подставляя (3.1) в (2.14), делая замену $z = e^{i\xi}$, $-\pi \leq \xi \leq \pi$, и интегрируя по частям, найдем, что при любом $T > 0$ имеет место неравенство

$$\left\| \sum_{n=1}^{\infty} |F_j(n, t)| \right\|_{C[0, T]} < \infty. \quad (4.2)$$

Кроме того, преобразуя разности $F_2(n+2p, t) - F_1(n, t)$, $p = 0, 1$, с помощью (2.14), (3.1) и интегрируя дважды по частям, получаем, что

$$\left\| \sum_{n=1}^{\infty} n |F_2(n+2p, t) - F_1(n, t)| \right\|_{C[0, T]} < \infty, \quad p = 0, 1. \quad (4.3)$$

В пространстве $\ell_1[1, \infty)$ определим операторы $\mathcal{F}_{j,n}(t)$, полагая

$$(\mathcal{F}_{j,n}(t)y)_m = \sum_{k=1}^{\infty} F_j(2n+m+k, t)y_k, \quad j = 1, 2, n \geq j-1.$$

Нормы этих операторов в пространстве $\ell_1[1, \infty)$ удовлетворяют оценкам

$$\|\mathcal{F}_{j,n}(t)\| \leq \sum_{k=2n+2}^{\infty} |F_j(k, t)|. \quad (4.4)$$

Согласно (4.2) оператор $\mathcal{F}_{j,n}(t)$ непрерывен по норме на каждом конечном отрезке $[0, T]$. Кроме того, из (4.3) следует, что для любых $n, n \geq j-1$ и $j, j = 1, 2$ оператор $I + \mathcal{F}_{j,n}(t)$ имеет при всех $t \in [0, T]$ ограниченный обратный. Так как оператор $I + \mathcal{F}_{j,n}(t)$ непрерывен по норме на $[0, T]$, обратный оператор $(I + \mathcal{F}_{j,n}(t))^{-1}$ также непрерывен (см. [16]) по норме на $[0, T]$ и, в частности, равномерно ограничен на $[0, T]$. Более того, этот обратный оператор ограничен в $\ell_1[1, \infty)$ по норме равномерно относительно $t \in [0, T]$ и $n \geq j-1, j = 1, 2$. Действительно, в силу (4.2), (4.4) при $n > n_0$ имеем

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|\mathcal{F}_{j,n}(t)\| \leq \max_{0 \leq t \leq T} \sum_{k=2n+2}^{\infty} |F_j(k, t)| < \frac{1}{2},$$

откуда $\|(I + \mathcal{F}_{j,n}(t))^{-1}\| \leq (1 - \|\mathcal{F}_{j,n}(t)\|)^{-1} < 2$ при $n > n_0$.

Остается конечное число операторов $(I + \mathcal{F}_{j,n}(t))^{-1}, j-1 \leq n \leq n_0, j = 1, 2$, каждый из которых равномерно ограничен на $[0, T]$.

Далее, согласно (4.1), (4.3) оператор $I + \mathcal{F}_{j,n}(t)$ сильно непрерывно дифференцируем. Тогда (см. [16]) обратный оператор $(I + \mathcal{F}_{j,n}(t))^{-1}$ также сильно дифференцируем и верна формула

$$[(I + \mathcal{F}_{j,n}(t))^{-1}]'_t = -(I + \mathcal{F}_{j,n}(t))^{-1} [\mathcal{F}_{j,n}(t)]'_t (I + \mathcal{F}_{j,n}(t))^{-1}. \quad (4.5)$$

С другой стороны, при выполнении (4.3) уравнения (2.15) с параметром t для каждого $n \geq j-1$, $j = 1, 2$, однозначно разрешимы в $\ell_1[1, \infty)$. При этом решения $K_j(n, m, t)$, $j = 1, 2$, и согласно (4.5) их производные по t удовлетворяют неравенствам, аналогичным (2.19), (2.21). Поэтому если мы определим функцию $a_n = a_n(t)$ из равенств (2.5), т. е. по формулам

$$a_{2n-j}^2(t) = \hat{a}_j^2 + (-1)^j \hat{a}_0 \hat{a}_1 \{K_1(n-j, 1, t) - K_2(n, 1, t)\}, \quad j = 0, 1, \quad (4.6)$$

то функция $a_n(t) - \hat{a}_n$ и ее производная будут быстро убывающими.

Докажем, что определенная по формулам (4.6) функция $a_n(t)$ удовлетворяет уравнению (1.1) с учетом граничного условия (1.3). Для этого установим некоторые априорные соотношения.

Как отмечалось в предыдущем разделе, если $a_n(t)$ — решение задачи (1.1)–(1.3), то оператор $B = \frac{d}{dt} - \mathcal{A}$ переводит дифференцируемые по t решения уравнения $L\psi = \lambda\psi$ в решения этого же уравнения. Пусть теперь $a_n(t) - \hat{a}_n$, $\dot{a}_n(t)$ — быстро убывающие функции и оператор B преобразует дифференцируемое по t решение ψ уравнения $L\psi = \lambda\psi$ в какое-то решение того же уравнения. Тогда

$$(\dot{L} - \mathcal{A}L + L\mathcal{A})\psi = 0.$$

С другой стороны, при условии $Q_3(0) < \infty$ векторы $\{u_n(\lambda, t)\}_{n=1}^\infty$ для всех $\lambda \in \partial\Gamma$ и $\lambda = \lambda_k$, $k = 1, \dots, N_0$, в силу (2.4), (2.10), (2.12), (3.1) служат дифференцируемыми по t решениями уравнения $L\psi = \lambda\psi$. Поэтому если мы покажем, что при $\lambda \in \partial\Gamma$, $\lambda = \lambda_k$, $k = 1, \dots, N_0$, выполняется равенство

$$LB[u_n(\lambda, t)] = \lambda B[u_n(\lambda, t)], \quad (4.7)$$

то ввиду (2.11) получим соотношение (3.2), которое эквивалентно соотношениям (1.1), (1.3). Следует отметить, что справедливость равенств (4.7) при $n > 2$ можно доказать, как и в [10, 13], сводя эту задачу к проверке равенств $B[f_n(\lambda, t)] = \frac{1}{2} \hat{a}_0 \hat{a}_1 (z - z^{-1}) f_n(\lambda, t)$. Однако для оператора B использованные в [10, 13] априорные соотношения никак не позволяют проверить справедливость последнего равенства при $n = 1$ и $n = 2$. Эта трудность преодолевается при помощи «эффективного переопределения» оператора B и некоторого априорного равенства, характерного для начально-краевой задачи (1.1)–(1.3).

Положим $a_{-1}(t) \equiv \hat{a}_0$, $a_0(t) \equiv \hat{a}_0$ и введем в рассмотрение семейство уравнений

$$a_{n-1}(t)y_{n-1} + a_n(t)y_{n+1} = \lambda y_n, \quad n \geq 0, \quad (4.8)$$

где коэффициенты $a_n(t)$ при $n \geq 1$ определяются из формул (4.6). Согласно (2.10) функции $u_n(\lambda, t)$ для всех $\lambda \in \partial\Gamma$ и $\lambda = \lambda_k$, $k = 1, \dots, N_0$, удовлетворяют (4.8) при $n \geq 1$, причем $u_0(\lambda, t) \equiv 0$. Полагая тогда $u_{-1}(\lambda, t) \equiv -u_1(\lambda, t)$, получим решение уравнения (4.8). Кроме того, как следует из [14, 15], формулы (2.4) вместе с

$$f_{-1}(\lambda, t) = \alpha_2(0, t) \left(1 + \sum_{m=1}^{\infty} K_2(0, m, t) z^m \right) \quad (4.9)$$

тоже определяют решение уравнения (4.8). Воспользовавшись (2.5) и равенством $\frac{\hat{a}_0}{\hat{a}_1} = \frac{\alpha_1(0, t)}{\alpha_2(0, t)}$, находим, что

$$\alpha_2(0, t) = \frac{\hat{a}_1}{\hat{a}_0} \alpha_2(1, t). \quad (4.10)$$

С другой стороны, из (2.9) со всей очевидностью вытекает, что

$$\frac{\varphi_{-1}(\lambda, t)}{\hat{a}_0 f_0(\lambda, t)} = \frac{\lambda}{\hat{a}_0 \hat{a}_1 (z^{-1} - z)} \{ \overline{f_{-1}(\lambda, t)} - S(z(\lambda), t) f_{-1}(\lambda, t) \},$$

где $\varphi_{-1}(\lambda, t) \equiv -1$. Умножим обе части последнего тождества на z^m ($m \geq 1$) и проведем интегрирование по λ вдоль $\partial\Gamma$. Пользуясь (2.4), (4.9), (4.10) и теоремой о вычетах, имеем

$$F_2(m, t) + K_2(0, m, t) + \sum_{r=1}^{\infty} K_2(0, r, t) F_2(r + m, t) = 0, \quad m \geq 2, \quad (4.11)$$

$$\frac{\hat{a}_0}{\hat{a}_1} \alpha_2^{-2}(1, t) + F_2(1, t) + K_2(0, 1, t) + \sum_{r=1}^{\infty} K_2(0, r, t) F_2(r + 1, t) = 0. \quad (4.12)$$

Рассмотрим теперь оператор \tilde{B} , действующий по формулам

$$(\tilde{B}y)_1 = (By)_1 - \frac{1}{2} \hat{a}_0^2 (y_1 + y_{-1}), \quad (\tilde{B}y)_2 = (By)_2 - \frac{1}{2} \hat{a}_0 a_1(t) y_0,$$

$$(\tilde{B}y)_n = (By)_n, \quad n > 2.$$

Так как при $\lambda \in \partial\Gamma$, $\lambda = \lambda_k$, $k = 1, \dots, N_0$, выполняются тождества $u_0(\lambda, t) \equiv 0$, $u_1(\lambda, t) + u_{-1}(\lambda, t) \equiv 0$, то $\tilde{B}[u_n(\lambda, t)] = B[u_n(\lambda, t)]$, $n \geq 1$. Следовательно, уравнение (4.7) можно заменить эквивалентным уравнением $L\tilde{B}[u_n(\lambda, t)] = \lambda\tilde{B}[u_n(\lambda, t)]$. Последнее равенство заведомо выполняется, если $\tilde{B}[f_n(\lambda, t)]$ удовлетворяет уравнению (2.1) с параметром t , где следует учесть, что $\tilde{B}[f_0(\lambda, t)]$ доопределено формулой $\tilde{B}[f_0(\lambda, t)] = \frac{1}{2} \hat{a}_0 \hat{a}_1 (z - z^{-1}) f_0(\lambda, t)$. Так как $\tilde{B}[f_n(\lambda, t)]$ имеет при $n \rightarrow \infty$ асимптотику

$$\tilde{B}[f_{2n+1-j}(\lambda, t)] = \frac{1}{2} \hat{a}_0 \hat{a}_1 (z - z^{-1}) \left(\frac{\hat{a}_0 z + \hat{a}_1}{\lambda} \right)^{2-j} z^n (1 + o(1)), \quad j = 1, 2,$$

а уравнение (2.1) обладает единственным решением с такой асимптотикой, то получим

$$\tilde{B}[f_n(\lambda, t)] = \frac{1}{2} \hat{a}_0 \hat{a}_1 (z - z^{-1}) f_T(\lambda, t). \quad (4.13)$$

Таким образом, при выполнении условий $N = 2$ и $Q_3(0) < \infty$ функция $a_n(t)$, определенная формулами (4.6), удовлетворяет задаче (1.1)–(1.3), если уравнение (4.13) превращается в верное равенство.

Установим справедливость (4.13). Для этого нам понадобятся некоторые априорные равенства относительно величин $K_j(n, m, t)$ и $\alpha_j(n, t)$.

Лемма 1. *Имеют место соотношения*

$$\begin{aligned} & \dot{K}_j(n, m, t) + \hat{a}_0 \hat{a}_1 \{ K_j(n, m + 1, t) - K_j(n - 1, m + 1, t) \} \\ & + \{ \hat{a}_0^2 - a_{2(n+1-j)}^2(t) + \hat{a}_1^2 - a_{2n-1}^2(t) \} K_j(n, m, t) = 0, \quad j = 1, 2, \quad n \geq 1, \quad m \geq 1, \end{aligned} \quad (4.14)$$

$$\dot{\alpha}_j(n, t) = \frac{1}{2} \{ \hat{a}_0^2 - a_{2(n+1-j)}^2(t) + \hat{a}_1^2 - a_{2n-1}^2(t) \} \alpha_j(n, t), \quad j = 1, 2, \quad n \geq j, \quad (4.15)$$

$$\dot{\alpha}_2(1, t) = \frac{1}{2} \{ \hat{a}_0^2 + \hat{a}_1^2 - a_1^2(t) \} \alpha_2(1, t). \quad (4.16)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство равенств (4.14), (4.15) ничем не отличается от доказательств соответствующих утверждений, установленных в [10]. Установим равенство (4.16). Дифференцируя соотношение (2.16) при $j = 2$ и $n = 1$, получаем

$$\dot{\alpha}_2(1, t) = -\frac{1}{2}\beta(n, t)\alpha_2^3(1, t),$$

где

$$\beta(n, t) = \dot{F}_2(2, t) + \sum_{m=1}^{\infty} K_2(1, m, t)\dot{F}_2(2 + m, t) - \sum_{m=1}^{\infty} \dot{K}_2(1, m, t)F_2(2 + m, t).$$

Используя (3.1), найдем, что

$$\begin{aligned} \beta(n, t) = & \hat{a}_0\hat{a}_1 \left\{ F_2(1, t) + \sum_{m=1}^{\infty} K_2(0, m, t)F_2(1 + m, t) \right\} \\ & - \hat{a}_0\hat{a}_1 \left\{ F_2(3, t) + \sum_{m=1}^{\infty} K_2(1, m, t)F_2(3 + m, t) \right\} \\ & + \hat{a}_0\hat{a}_1 \sum_{m=1}^{\infty} \{K_2(1, m, t) - K_2(0, m, t)\}F_2(1 + m, t) + \sum_{m=1}^{\infty} \dot{K}_2(1, m, t)F_2(2 + m, t). \end{aligned}$$

Из последнего равенства с учетом (4.12) получим

$$\begin{aligned} \beta(n, t) = & -\hat{a}_0^2\alpha_2^{-2}(1, t) + \hat{a}_0\hat{a}_1\{K_2(1, 1, t) - K_2(0, 1, t)\}(1 + F_2(2, t)) \\ & + \hat{a}_0\hat{a}_1\{K_2(1, m + 1, t) - K_2(0, m + 1, t)\}F_2(2 + m, t) + \sum_{m=1}^{\infty} \dot{K}_2(1, m, t)F_2(2 + m, t). \end{aligned}$$

Воспользовавшись (2.16), (4.14) и равенствами

$$\hat{a}_0\hat{a}_1\{K_2(1, 1, t) - K_2(0, 1, t)\} = a_0^2(t) - \hat{a}_0^2 + a_1^2(t) - \hat{a}_1^2, \quad a_0(t) \equiv \hat{a}_0,$$

имеем

$$\beta(n, t) = \{a_1^2(t) - \hat{a}_0^2 - \hat{a}_1^2\}\alpha_2^{-2}(1, t),$$

откуда вытекает (4.16). Лемма доказана.

Мы теперь подготовлены к тому, чтобы доказать (4.13). Подставляя в (4.13) вместо $f_n(\lambda, t)$ его представления (2.4), (4.9) и принимая во внимание (4.15), (4.16), найдем, что соотношение (4.13) эквивалентно следующим равенствам:

$$\begin{aligned} \dot{K}_j(n, m, t) + \frac{1}{2}\hat{a}_0\hat{a}_1\{K_j(n, m + 1, t) - K_j(n - 1, m + 1, t)\} \\ + \frac{1}{2}\{\hat{a}_0^2 - a_{2(n+1-j)}^2(t) + \hat{a}_1^2 - a_{2n-1}^2(t)\}K_j(n, m, t) = \frac{1}{2}\hat{a}_0\hat{a}_1K_j(n, m - 1, t) \\ - \frac{1}{2}(\hat{a}_0\hat{a}_1)^{-1}a_{2n}^2(t)a_{2(n-j)+3}^2(t)K_j(n + 1, m - 1, t), \quad n \geq 1, m \geq 1, j = 1, 2, \end{aligned}$$

где $K_j(n, 0, t)$ доопределена формулой $K_j(n, 0, t) = 1$. В силу (4.14) последние равенства, в свою очередь, эквивалентны следующим:

$$\begin{aligned} \hat{a}_0\hat{a}_1\{K_j(n, m + 1, t) - K_j(n - 1, m + 1, t)\} \\ + \{\hat{a}_0^2 - a_{2(n+1-j)}^2(t) + \hat{a}_1^2 - a_{2n-1}^2(t)\}K_j(n, m, t) \\ = (\hat{a}_0\hat{a}_1)^{-1}a_{2n}^2(t)a_{2(n-j)+3}^2(t)K_j(n + 1, m - 1, t) - \hat{a}_0\hat{a}_1K_j(n, m - 1, t), \quad j = 1, 2, \end{aligned}$$

которые являются очевидными следствиями тождеств (2.7), (2.8) при включении значения $n = 0$ для (2.7). Следовательно, справедливо равенство (4.13). Последнее влечет за собой существование быстро убывающего решения задачи (1.1)–(1.3) при $N = 2$. Из однозначной разрешимости обратной задачи, изложенной в разд. 2, вытекает единственность этого решения. Тем самым доказана

Теорема 2. При условиях $N = 2$ и $Q_3(0) < \infty$ задача (1.1)–(1.3) имеет в классе (1.4) единственное решение.

ЗАМЕЧАНИЕ 1. В случае $\hat{a}_0 = \hat{a}_1$ доказанная теорема обеспечивает однозначную разрешимость задачи (1.1)–(1.3) при $N = 1$ в классе быстро убывающих функций.

5. Случай $N > 2$. Исследование существования решения. В предыдущем разделе мы установили однозначную разрешимость задачи (1.1)–(1.3) в классе (1.4) в том случае, когда $N \leq 2$. Оказывается, что в общем случае разрешимость этой задачи тесно связана с наименьшим периодом последовательности \hat{a}_n .

Теорема 3. Задача (1.1)–(1.3) не имеет в классе (1.4) решений, если число $N > 2$ является наименьшим периодом последовательности \hat{a}_n .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим противное. Пусть число 2 не является периодом последовательности \hat{a}_n и задача (1.1)–(1.3) имеет в классе (1.4) решение $a_n(t)$. Положим

$$c_{j,n} = a_{nN+j-1}(t), \quad j = 1, \dots, N, \quad n = 0, 1, \dots \quad (5.1)$$

Тогда из уравнения (1.1) вытекает, что функции $c_{j,n}$ удовлетворяют системе уравнений

$$\begin{cases} \dot{c}_{1,n} = c_{1,n}(c_{N,n-1} - c_{2,n}), \\ \dot{c}_{j,n} = c_{j,n}(c_{j-1,n} - c_{j+1,n}), & j = 2, \dots, N-1. \\ \dot{c}_{N,n} = c_{N,n}(c_{N-1,n} - c_{1,n+1}), \end{cases} \quad (5.2)$$

Рассмотрим теперь уравнение

$$a_{n-1}(t)y_{n-1} + a_n(t)y_{n+1} = \lambda y_n, \quad n = 1, 2, \dots, \quad a_0(t) = \hat{a}_0, \quad (5.3)$$

где $a_n(t)$, $n \geq 1$, служит быстро убывающим решением задачи (1.1)–(1.3). Как показано в [17], уравнение (5.3) имеет решение $f_n = f_n(\lambda, t)$, представимое в виде

$$\begin{aligned} f_{nN+j-1} &= \alpha_{nN+j-1} z_0^n(\lambda) \\ &\times \left(e_j(\lambda) + \sum_{m=1}^{\infty} \{ A_{nm}^{j1} e_1(\lambda) + \dots + A_{nm}^{jj} e_j(\lambda) + A_{nm}^{j,j+1} e_{j+1}(\lambda) z_0^{-1}(\lambda) + \dots \right. \\ &\quad \left. + A_{nm}^{jN} e_N(\lambda) z_0^{-1}(\lambda) \} z_0^m(\lambda) \right), \quad j = 1, \dots, N, \quad (5.4) \end{aligned}$$

где $\psi_{nN+j-1} = e_j(\lambda) z_0^n(\lambda)$, $j = 1, \dots, N$, — решение Флоке уравнения (5.3), а величины A_{nm}^{jr} зависят от t и $A_{nm}^{jr} = o(1)$ при $n + m \rightarrow \infty$.

Подставляя решение (5.4) в уравнение (5.3) и приравнивая коэффициенты при $e_j(\lambda) z_0^m(\lambda)$ (см. [17]), с учетом (5.1) получаем, что

$$\begin{aligned} \frac{c_{1,n}}{\hat{a}_0} &= \hat{a}_0 + \hat{a}_1 A_{n1}^{13} - \hat{a}_{N-1} A_{n-1,1}^{N2}, \\ \frac{c_{j,n}}{\hat{a}_{j-1}} &= \hat{a}_{j-1} + \hat{a}_j A_{n1}^{j,j+2} - \hat{a}_{j-2} A_{n1}^{j-1,j+1}, \quad j = 2, \dots, N-1, \\ \frac{c_{N,n}}{\hat{a}_{N-1}} &= \hat{a}_{N-1} + \hat{a}_0 A_{n1}^{N2} - \hat{a}_{N-2} A_{n1}^{N-1,1}. \end{aligned} \quad (5.5)$$

Заметим, что одна из пар $\{\hat{a}_0, \hat{a}_{N-2}\}$, $\{\hat{a}_1, \hat{a}_{N-1}\}$, $\{\hat{a}_j, \hat{a}_{j+2}\}$, $j = 0, \dots, N-3$, обязательно содержит два различных числа, так как число 2 не является периодом последовательности \hat{a}_n . Пусть, например, $\hat{a}_1 \neq \hat{a}_{N-1}$. Воспользовавшись равенствами (5.5), получим

$$\hat{a}_0 \hat{a}_{N-1} A_{n-1,1}^{N2} = \sum_{k=n}^{\infty} \{(\hat{a}_0^2 - c_{1,k}) + (\hat{a}_1^2 - c_{2,k}) + \dots + (\hat{a}_{N-1}^2 - c_{N,k})\},$$

$$\hat{a}_0 \hat{a}_1 A_{n1}^{13} = \sum_{k=n}^{\infty} \{(\hat{a}_0^2 - c_{1,k+1}) + (\hat{a}_1^2 - c_{2,k}) + \dots + (\hat{a}_{N-1}^2 - c_{N,k})\}.$$

Из (5.1), (5.2) и последних равенств вытекает, что функции $A_{n-1,1}^{N2}$, A_{n1}^{13} дифференцируемы по t и

$$\hat{a}_0 \hat{a}_{N-1} \dot{A}_{n-1,1}^{N2} = \hat{a}_0^2 \hat{a}_{N-1}^2 - c_{1,n} c_{N,n-1}, \quad \hat{a}_0 \hat{a}_1 \dot{A}_{n1}^{13} = \hat{a}_0^2 \hat{a}_1^2 - c_{1,n} c_{2,n}.$$

Отсюда и из первого тождества соотношений (5.5) следует, что

$$\dot{c}_{1,n} \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty,$$

где мы учли (5.1).

С другой стороны, в силу (5.1), (5.2) имеем

$$\dot{c}_{1,n} \rightarrow \hat{a}_0^2 (\hat{a}_{N-1}^2 - \hat{a}_1^2) \neq 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Полученное противоречие и доказывает теорему.

Автор выражает благодарность рецензенту за полезные замечания, которые способствовали улучшению содержания статьи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Захаров В. Е., Манаков С. В., Новиков С. П., Питаевский Л. П. Теория солитонов. Метод обратной задачи. М.: Наука, 1980.
2. Flashka H. On the Toda lattice. Inverse scattering solutions // Progr. Theor. Phys. 1974. V. 51, N 3. P. 703–716.
3. Кас М., van Moerbeke P. On the explicitly soluble system of nonlinear differential equation related to certain Toda lattices // Adv. Math. 1975. V. 16, N 2. P. 160–169.
4. Березанский Ю. М. Интегрирование нелинейных разностных уравнений методом обратной спектральной задачи // Докл. АН СССР. 1985. Т. 281, № 1. С. 16–19.
5. Новокшенов В. Ю., Хабибуллин И. Т. Нелинейные дифференциально-разностные схемы, интегрируемые методом обратной задачи рассеяния. Асимптотика решения при $t \rightarrow \infty$ // Докл. АН СССР. 1981. Т. 257, № 3. С. 543–547.
6. Веселов А. П. Интегрирование стационарной задачи для классической цепочки // Теор. и мат. физика. 1987. Т. 71, № 1. С. 154–159.
7. Юрко В. А. Об интегрировании нелинейных динамических систем методом обратной спектральной задачи // Мат. заметки. 1995. Т. 57, № 6. С. 945–949.
8. Teschl G. Jacobi operators and completely integrable nonlinear lattices. Providence, RI: Amer. Math. Soc., 2000. (Math. Surv. Monogr.; V. 72).
9. Верещагин В. Л. Асимптотическое разложение решения задачи Коши для цепочки Вольтерра со ступенобразным начальным условием // Теор. и мат. физика. 1997. Т. 111, № 3. С. 335–344.
10. Ханмамедов Аг. Х. Метод интегрирования задачи Коши для лэнгмюровской цепочки с расходящимся начальным условием // Журн. вычисл. математики и мат. физики. 2005. Т. 45, № 9. С. 1639–1650.
11. Egorova I., Michor J., Teschl G. Inverse scattering transform for the Toda hierarchy with quasi-periodic background // Proc. Amer. Math. Soc. 2007. V. 135, N 6. P. 1817–1827.

12. Уразбоев Г. У. Цепочка Тоды со специальным самосогласованным источником // Теор. и мат. физика. 2008. Т. 154, № 2. С. 305–315.
13. Ханмамедов Аг. Х. О быстро убывающем решении задачи Коши для цепочки Тоды // Теор. и мат. физика. 2005. Т. 142, № 1. С. 5–12.
14. *Khanmamedov Ag. Kh.* Triangular representations of the solution of a difference equations system // Trans. of AS of Azerb. ser. phys. - techn. and math. sci. 2001. V. 21, N 1. P. 104–109.
15. Ханмамедов Аг. Х. Обратная задача рассеяния для разностных уравнений на полуоси // Докл. НАН Азерб. 2000. № 4–6. С. 19–25.
16. Крейн С. Г. Линейные дифференциальные уравнения в банаховом пространстве. М.: Наука, 1967.
17. Ханмамедов Аг. Х. Прямая и обратная задачи рассеяния для возмущенного разностного уравнения Хилла // Мат. сб. 2005. Т. 196, № 10. С. 137–160.

Статья поступила 14 декабря 2007 г., окончательный вариант — 19 ноября 2009 г.

Ханмамедов Агил Ханмамед оглы
Бакинский гос. университет, факультет прикладной математики и кибернетики,
ул. З. Халилова, 23, Баку AZ 1148, Азербайджан
agil_khanmamedov@yahoo.com