

УДК 517.95

НОВЫЕ АПРИОРНЫЕ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ АНИЗОТРОПНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Ар. С. Терсенов

Аннотация. Рассматривается задача Дирихле для сингулярных анизотропных эллиптических уравнений с нелинейным источником. Получены новые априорные оценки, показывающие, что разрешимость задачи Дирихле в классе ограниченных решений существенно зависит от размерности области, в которой она исследуется.

Ключевые слова: анизотропное эллиптическое уравнение, задача Дирихле.

§ 1. Введение и основные результаты

Статья посвящена исследованию задачи Дирихле для анизотропного эллиптического уравнения вида

$$-\sum_{i=1}^N \mu_i (|u_{x_i}|^{p_i-2} u_{x_i})_{x_i} = c(\mathbf{x})g(u) + f(\mathbf{x}) \quad \text{в } \Omega \subset \mathbb{R}^N, \quad (1.1)$$

$$u = 0 \quad \text{на } \partial\Omega, \quad (1.2)$$

где $\mu_i > 0$ и $p_i > 1$, $i = 1, \dots, N$. Без ограничения общности будем считать, что

$$\Omega \subset \{\mathbf{x} : -l_i \leq x_i \leq l_i, i = 1, \dots, N\}.$$

Относительно функции g предполагаем, что она удовлетворяет следующему условию:

$$g(0) = 0, \quad |g(\xi)| \leq g(\eta) \quad \text{для любых } \xi, \eta \text{ таких, что } |\xi| \leq \eta. \quad (1.3)$$

Например, функции $g(u) = \ln(|u|+1)$, $g(u) = |u|^{q-1}u$, $g(u) = |u|^q$ или $g(u) = e^u - 1$ удовлетворяют условию (1.3).

К настоящему времени можно отметить неуклонно возрастающий интерес к анизотропным эллиптическим уравнениям и большое количество работ, посвященных данной тематике. Проблемы, связанные с разрешимостью различных краевых задач, а также с исследованием качественных свойств этих решений, изучались в [1–32].

На протяжении всей статьи будем считать, что функция f не обращается в нуль тождественно в области Ω . Литература, посвященная исследованию анизотропных эллиптических уравнений при данных предположениях, не так обширна, как в случае, когда в правой части уравнения (1.1) функция f вообще отсутствует. Задача типа (1.1), (1.2) с функцией f , не обращающейся в нуль тождественно, а также ее параболические аналоги исследованы в работах [3–8, 11–13, 23, 24, 29–33].

В [30] в несингулярном случае $p_i \geq 2, i = 1, \dots, N$ (сингулярный случай см. в [29]), уравнение (1.1) аппроксимируется последовательностью неравномерно эллиптических невырождающихся уравнений. На основе априорных оценок решения и градиента решения регуляризованной задачи и последующего перехода к пределу получены достаточные условия разрешимости задачи (1.1), (1.2) в классе $W^{1,\infty}$. Одним из ключевых условий в [30] является существование положительной постоянной M такой, что выполнено следующее неравенство:

$$(c_0g(M) + f_0) \left(\frac{3l^2 + 2l}{2} \right)^{p-1} < \mu(p-1)M^{p-1}. \tag{1.4}$$

Здесь $p = p_{i_0} = \max\{p_1, \dots, p_N\}$, $\mu = \mu_{i_0}, l = l_{i_0}, c_0 = \|c(\mathbf{x})\|_{L^\infty}$ и $f_0 = \|f(\mathbf{x})\|_{L^\infty}$. Если такая постоянная существует, то для любого решения $u \in W^{1,\infty}$ задачи (1.1), (1.2) имеем $\|u\|_{L^\infty} \leq M_0$, где $M_0 = \inf\{M : M \text{ удовлетворяет (1.4)}\}$.

Заметим, что если $c(x) \leq 0$ и $g(u)$ — неубывающая функция, то из доказательства леммы 1 в [30] вытекает, что (1.4) может быть заменено следующим условием:

$$f_0 < \left(\frac{3l^2 + 2l}{2} \right)^{1-p} \mu(p-1)M^{p-1}. \tag{1.5}$$

Таким образом, задача (1.1), (1.2) в этом случае имеет решение из класса $W^{1,\infty}$ для произвольной функции $f(\mathbf{x}) \in L^\infty(\Omega)$. Отметим также некоторые другие случаи, в которых имеется аналогичная разрешимость. Например, если $g(u) = |u|^{q-1}u$ или $g(u) = |u|^q$ и $p-1 > q$, то для произвольной функции $f(\mathbf{x}) \in L^\infty(\Omega)$ существует положительная постоянная M , которая удовлетворяет условию (1.4). Как следствие получаем существование обобщенного решения из класса $u \in W^{1,\infty}$ (см. теорему 1 в [30]). Если же $q \geq p-1$, то существование такой постоянной M зависит от соотношений между параметрами задачи, т. е. от того, как соотносятся друг с другом значения постоянных $p_i, l_i, \mu_i, i = 1, \dots, N, c_0, f_0$, и также от поведения функции g . Таким образом, при определенных условиях на гладкость коэффициентов и на форму области из существования положительной постоянной M , удовлетворяющей (1.4), вытекает разрешимость задачи (1.1), (1.2) в классе ограниченных функций.

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы показать, что в сингулярном случае, т. е. в случае, когда в уравнении присутствуют члены с $p_i < 2$, размерность играет существенную роль в существовании постоянной M , а следовательно, и в существовании слабого ограниченного решения задачи (1.1), (1.2).

Без ограничения общности будем считать, что $1 < p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_K < 2 \leq p_{K+1} \leq \dots \leq p_N$, где $1 \leq K \leq N$ — некоторое фиксированное натуральное число. Положим

$$A(\delta) = \frac{\left[\prod_{i=1}^K \mu_i(p_i - 1)(2l_i + \delta)^{p_i-2} \right]^{1/K}}{\left[\frac{3l_N^2}{2} + l_N + \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \left(\frac{3l_i^2}{2} + \delta l_i \right) \right]^{\bar{p}_\sigma-1}}, \tag{1.6}$$

$$B(\delta) = \frac{\mu_N(p_N - 1)}{\left[\frac{3l_N^2}{2} + l_N + \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \left(\frac{3l_i^2}{2} + \delta l_i \right) \right]^{p_N-1}},$$

где $\bar{p}_\sigma = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K p_i$, δ — фиксированная положительная постоянная. В случае, когда $K = N$, будем считать, что

$$A(\delta) = \frac{\left[\prod_{i=1}^N \mu_i (p_i - 1) (2l_i + \delta)^{p_i - 2} \right]^{1/N}}{\left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{3l_i^2}{2} + \delta l_i \right) \right]^{\bar{p}_\sigma - 1}}, \quad B(\delta) = 0.$$

Для того чтобы исключить случаи, когда задача (1.1), (1.2) разрешима в указанном классе для произвольной $f(\mathbf{x}) \in L^\infty(\Omega)$ (согласно (1.4)), предположим, что $|g(u)| > C|u|^{pN-1}$ при $|u| \geq u_0$, где u_0 — некоторая положительная константа, а $C = \frac{B(0)}{c_0}$. В случае, когда $g(u)$ является неубывающей функцией, будем дополнительно предполагать, что либо $c(\mathbf{x}) \geq 0$, либо $c(\mathbf{x})$ не имеет определенного знака.

Введем в рассмотрение функцию

$$F(M, \delta) \equiv \frac{1}{A(\delta)} (c_0 g(M) M^{1-\bar{p}_\sigma} - B(\delta) M^{pN-\bar{p}_\sigma} + f_0 M^{1-\bar{p}_\sigma}).$$

Из (1.6) легко видеть, что функция $F(M, \delta)$ является возрастающей функцией относительно δ . Обозначим через M_0 точку, в которой функция $F(M, 0)$ достигает своего минимума (существование положительного минимума у функции $F(M, 0)$ будет показано ниже). Предположим теперь, что

$$F(M_0, 0) < K^{2-\bar{p}_\sigma}. \quad (1.7)$$

Введем следующие обозначения:

$$\mathfrak{F} = \{M \in (0, \infty) : F(M, 0) < K^{2-\bar{p}_\sigma}\}, \quad M_* = \inf \mathfrak{F}, \quad (1.8)$$

$$\mathfrak{F}_\delta = \{M \in (0, \infty) : F(M, \delta) < K^{2-\bar{p}_\sigma}\}, \quad M_\delta = \inf \mathfrak{F}_\delta. \quad (1.9)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Будем говорить, что функция $u(\mathbf{x})$ является *обобщенным решением задачи* (0.1), (0.2), если $u(\mathbf{x}) \in W^{1,\infty}(\Omega)$, $u(\mathbf{x}) = 0$ для $\mathbf{x} \in \partial\Omega$ и

$$\int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \mu_i |u_{x_i}|^{p_i-2} u_{x_i} \phi_{x_i}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\Omega} (c(\mathbf{x})g(u) + f(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x})) d\mathbf{x} \quad \forall \phi \in \overset{\circ}{W}^{1,pN}(\Omega).$$

Предположим, что область, в которой исследуется задача (1.1), (1.2), удовлетворяет условию

(А) область Ω строго выпукла и части границы $\partial\Omega \in C^2$, лежащие в полупространствах $x_i \leq 0$ и $x_i \geq 0$, $i = 1, \dots, N$, могут быть представлены в виде

$$x_i = F_i(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_N) \quad \text{и} \quad x_i = G_i(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_N)$$

соответственно, где функции F_i и G_i не зависят от переменной x_i .

Сформулируем теперь основной результат настоящей работы.

Теорема 1.1. *Предположим, что $c(\mathbf{x}) \in L^\infty(\Omega)$, $f(\mathbf{x}) \in L^\infty(\Omega)$, $g(u)$ — непрерывная по Гёльдеру функция на промежутке $[-M_*, M_*]$ и выполнены*

условия (1.3), (1.7), (A). Тогда существует обобщенное решение задачи (1.1), (1.2) такое, что

$$\|u\|_{L_\infty(\Omega)} \leq M_* \text{ и } \|u_{x_i}\|_{L_\infty(\Omega)} \leq (1 + 2l_i) \left(\frac{\Phi_0}{\mu_i(p_i - 1)} \right)^{\frac{1}{p_i-1}}, \quad i = 1, \dots, N,$$

где

$$\Phi_0 = c_0 g(M_*) + f_0.$$

Доказательство теоремы 1.1 базируется на априорной оценке решения регуляризованной задачи (см. лемму 2.2) и градиента решения регуляризованной задачи (см. леммы 2, 3 в [30]) с последующим предельным переходом, описанным в теореме 1 из [30].

ЗАМЕЧАНИЕ 1.1 (О влиянии размерности на разрешимость задачи (1.1), (1.2)). Из условия (1.7) и определения функции $F(M, \delta)$ следует, что для произвольного фиксированного $f_0 = \|f(\mathbf{x})\|_{L_\infty(\Omega)}$ можно подобрать параметры задачи таким образом, чтобы (1.7) выполнялось. В частности, так будет, если потребовать малость области Ω или малость c_0 . Покажем, что выполнение условия (1.7), а следовательно, и разрешимость можно получать также и за счет размерности задачи. Пусть $l_- \leq l_i \leq l_+$, $\mu_- \leq \mu_i \leq \mu_+$, $p_- \leq p_i \leq p_+$ ($p_N = p_+$), $i = 1, \dots, N$. Тогда легко видеть, что имеют место неравенства

$$A_0 \equiv \frac{\mu_-(p_- - 1)}{(2l_+)^{2-\bar{p}_\sigma} (3l_+^2 + l_+)^{\bar{p}_\sigma - 1}} \leq A(0) \leq \frac{\mu_+(p_+ - 1)}{(2l_-)^{2-\bar{p}_\sigma} (3l_-^2 + l_-)^{\bar{p}_\sigma - 1}} \equiv A_1,$$

$$B_0 \equiv \frac{\mu_-(p_- - 1)}{(3l_+^2 + l_+)^{p_+ - 1}} \leq B(0) \leq \frac{\mu_+(p_+ - 1)}{(3l_-^2 + l_-)^{p_+ - 1}} \equiv B_1.$$

Из этих неравенств вытекает, что постоянные A_0, A_1, B_0, B_1 не зависят явно от размерности задачи. Зафиксируем теперь c_0, A_0, A_1, B_0, B_1 и предположим, что $A_0 \leq A(0) \leq A_1, B_0 \leq B(0) \leq B_1$. Тогда для произвольного фиксированного $f_0 = \|f(\mathbf{x})\|_{L_\infty(\Omega)}$ можно определить такое $K = K(A(0), B(0), \bar{p}_\sigma, p_N, c_0)$, что неравенство (1.7) будет выполняться. Таким образом, в сингулярном случае при указанных выше предположениях условие (1.7) определяет число показателей $1 < p_i < 2$ (и как следствие размерность), которое гарантирует существование ограниченного обобщенного решения задачи (1.1), (1.2). Проиллюстрируем это на нижеследующих примерах.

ПРИМЕР 1. Рассмотрим уравнение

$$-\sum_{i=1}^N (|u_{x_i}|^{-\frac{1}{2}} u_{x_i})_{x_i} = u + f_0 \quad \text{в } \Omega. \tag{1.10}$$

Здесь $\mu_i = 1, p_i = \frac{3}{2}, i = 1, \dots, N, \bar{p}_\sigma = \frac{3}{2}, q = 1$. Пусть $l_i = l, i = 1, \dots, N$. Выберем l таким, чтобы $A(0) = 2$. Из (1.6) следует, что $A(0) = 2$ при $l = \frac{1}{2\sqrt[3]{6}}$. Так как все члены сингулярны, то $B = 0$, и функция $F(M, 0)$ примет вид

$$F(M, 0) = \frac{1}{2} (M^{\frac{1}{2}} + f_0 M^{-\frac{1}{2}}).$$

Легко получить, что минимальное значение функция $F(M, 0)$ принимает в точке $M_0 = f_0$ и, следовательно, $F(M_0, 0) = f_0^{\frac{1}{2}}$. Из условия (1.7) вытекает, что задача Дирихле для уравнения (1.10) разрешима при условии, что $f_0 < N$.

Таким образом, для произвольных значений f_0 если выбрать $N > f_0$, то существует обобщенное решение $u(x) \in W^{1,\infty}$ задачи Дирихле для уравнения (1.10). Постоянная M_* является меньшим из двух корней многочлена

$$M^2 + (2f_0 - 4N)M + f_0^2,$$

следовательно, для решения имеет место оценка

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq 2N - f_0 - 2\sqrt{N(N - f_0)}.$$

ПРИМЕР 2. Рассмотрим уравнение

$$-\sum_{i=1}^{N-1} \mu_i (|u_{x_i}|^{-\frac{1}{2}} u_{x_i})_{x_i} + \mu_N (|u_{x_N}| u_{x_N})_{x_N} = c_0 u^4 + f_0 \quad \text{в } \Omega. \quad (1.11)$$

Здесь $p_i = \frac{3}{2}$, $i = 1, \dots, N-1$, $p_N = 3$, $\bar{p}_\sigma = \frac{3}{2}$, $q = 4$, $c_0 > 0$. Вычислив для заданной области Ω коэффициенты $A(0)$ и $B(0)$, получим, что функция $F(M, 0)$ в этом случае принимает вид

$$F(M, 0) = \frac{1}{A(0)} (c_0 M^{\frac{7}{2}} - B(0) M^{\frac{3}{2}} + f_0 M^{-\frac{1}{2}}).$$

После несложных вычислений получаем, что нахождение точки минимума функции $F(M, 0)$ сводится к вычислению корней многочлена четвертого порядка вида

$$7c_0 M^4 - 3B(0) M^2 - f_0.$$

Отсюда легко получаем, что минимальное значение функция $F(M, 0)$ достигает в точке

$$M_0 = \sqrt{\frac{3B(0) + \sqrt{9B^2(0) + 28c_0 f_0}}{14c_0}}.$$

Из условия (1.7) вытекает, что задача Дирихле для уравнения (1.11) разрешима, если $F(M_0, 0) < \sqrt{N-1}$. Если $F(M_0, 0) < 1$, то задача Дирихле имеет решение для любой размерности. Очевидно, что при достаточно больших f_0 имеем $F(M_0, 0) \geq 1$. Следовательно, для произвольных (достаточно больших) значений f_0 если выбрать $N > F^2(M_0, 0) + 1$, то существует обобщенное решение $u(x) \in W^{1,\infty}$ задачи Дирихле для уравнения (1.11). Постоянная M_* определяется как минимум из решений уравнения

$$c_0 M^4 - B(0) M^2 - A(0) \sqrt{N-1} \sqrt{M} + f_0 = 0.$$

§ 2. Априорная оценка решения регуляризованной задачи

Как говорилось выше, доказательство теоремы 1.1 базируется на априорной оценке решения задачи Дирихле для следующей регуляризации исходного уравнения (1.1):

$$-\sum_{i=1}^N \mu_i ((u_{x_i}^\alpha + \varepsilon)^{\frac{p_i-2}{\alpha}} u_{x_i})_{x_i} = c_\varepsilon(\mathbf{x}) g_M(u) + f_\varepsilon(\mathbf{x}). \quad (2.1)$$

Здесь постоянная $\alpha \in (0, 1)$ такова, что $(u_{x_i}^\alpha)^{\frac{p_i-2}{\alpha}} = |u_{x_i}|^{p_i-2}$, $\varepsilon > 0$, $c_\varepsilon(\mathbf{x})$, $f_\varepsilon(\mathbf{x})$ принадлежат пространству непрерывных по Гёльдеру функций таких, что

$$c_\varepsilon(\mathbf{x}) \rightarrow c(\mathbf{x}) \quad \text{и} \quad f_\varepsilon(\mathbf{x}) \rightarrow f(\mathbf{x}) \quad \text{в норме } L_\infty \quad \text{при } \varepsilon \rightarrow 0,$$

где без ограничения общности предполагаем, что

$$\max_{x \in \bar{\Omega}} |c_\varepsilon(x)| = c_0, \quad \max_{x \in \bar{\Omega}} |f_\varepsilon(x)| = f_0,$$

и, наконец,

$$g_M(z) = \begin{cases} g(z) & \text{для } |z| \leq M, \\ g(M) & \text{для } z > M, \\ g(-M) & \text{для } z < -M. \end{cases} \quad (2.2)$$

В этой априорной оценке, по сути, заключается новизна полученного в данной статье результата.

Рассмотрим регуляризованную задачу (2.1), (1.2). Перепишем уравнение (2.1) в недивергентном виде

$$-\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i}) u_{x_i x_i} = c_\varepsilon(\mathbf{x}) g_M(u) + f_\varepsilon(\mathbf{x}), \quad (2.3)$$

где $a_{i\varepsilon}(z) = \mu_i(z^\alpha + \varepsilon)^{\frac{p_i-2}{\alpha}-1}((p_i-1)z^\alpha + \varepsilon)$. Для начала покажем, что коэффициенты $a_{i\varepsilon}(z)$, $i = 1, \dots, N$, являются неубывающими функциями по параметру ε . Положим $\alpha_0 = \max_{1 < p_i < 2} (p_i - 1)$.

Лемма 2.1. Для произвольных $z \neq 0$ существует число $\varepsilon_0 = \varepsilon_0(\alpha, \alpha_0, z)$ такое, что для всех $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ коэффициенты $a_{i\varepsilon}(z)$, $i = 1, \dots, N$, являются неубывающими функциями по параметру ε .

Доказательство. Дифференцируя функции $a_{i\varepsilon}(z)$, $i = 1, \dots, N$, по параметру ε , получаем

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\varepsilon} a_{i\varepsilon}(z) &= \mu_i \left(\frac{p_i - 2}{\alpha} - 1 \right) (z^\alpha + \varepsilon)^{\frac{p_i-2}{\alpha}-2} ((p_i-1)z^\alpha + \varepsilon) + \mu_i (z^\alpha + \varepsilon)^{\frac{p_i-2}{\alpha}-1} \\ &= \mu_i (z^\alpha + \varepsilon)^{\frac{p_i-2}{\alpha}-2} \left[\left(\frac{p_i - 2}{\alpha} - 1 \right) ((p_i-1)z^\alpha + \varepsilon) + z^\alpha + \varepsilon \right]. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Приведем подобные члены в (2.4):

$$\frac{d}{d\varepsilon} a_{i\varepsilon}(z) = \frac{\mu_i}{\alpha} (z^\alpha + \varepsilon)^{\frac{p_i-2}{\alpha}-2} [(p_i^2 - p_i(3 + \alpha) + 2 + 2\alpha)z^\alpha + (p_i - 2)\varepsilon]. \quad (2.5)$$

В силу указанного выбора постоянной α имеем $z^\alpha > 0$. Остается показать, что

$$(p_i^2 - p_i(\alpha + 3) + 2 + 2\alpha)z^\alpha + (p_i - 2)\varepsilon \geq 0. \quad (2.6)$$

Легко видеть, что

$$P(p_i) \equiv p_i^2 - p_i(\alpha + 3) + 2 + 2\alpha \geq 0 \quad \text{при } p_i \in (1, 1 + \alpha] \cup [2, +\infty).$$

Более того, $P(2) = 0$, $P(1 + \alpha) = 0$, $P > 0$ при $p_i \in (1, 1 + \alpha) \cup (2, +\infty)$. Следовательно, если $p_i \geq 2$, то, очевидно, (2.6) выполняется. Если же $1 < p_i < 2$, то выбираем $\alpha > \alpha_0 = \max_{1 < p_i < 2} (p_i - 1)$ так, чтобы $p_i \in (1, 1 + \alpha)$. Перепишем неравенство (2.6) в виде

$$(p_i - 2)(p_i - 1 - \alpha)z^\alpha + (p_i - 2)\varepsilon \geq 0. \quad (2.7)$$

В силу того, что $z^\alpha > 0$ и $p_i \in (1, 1 + \alpha) \cup (2, +\infty)$, для всех $\varepsilon \leq \varepsilon_{0i} = (1 + \alpha - p_i)z^\alpha$ неравенство (2.6) выполняется также и в случае $1 < p_i < 2$. Таким образом,

функции $a_{i\varepsilon}(z)$, $i = 1, \dots, N$, неубывающие по ε для всех $\varepsilon \leq \varepsilon_0 = (1 + \alpha - \alpha_0)z^\alpha$ при $p_i > 1$, $i = 1, \dots, N$. Лемма 2.1 доказана. \square

Как говорилось выше, без ограничения общности будем считать, что $1 < p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_K < 2 \leq p_{K+1} \leq \dots \leq p_N$, где $1 \leq K \leq N$ — фиксированное натуральное число. Введем в рассмотрение функции $\sigma(\mathbf{x})$ и $r(\mathbf{x})$, которые определим следующим образом:

$$\sigma(\mathbf{x}) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \widetilde{M} \left(\frac{l_i^2 - x_i^2}{2} + (\delta + l_i)(l_i + x_i) \right), \quad (2.8)$$

$$r(\mathbf{x}) = \widetilde{M} \left(\frac{l_N^2 - x_N^2}{2} + (1 + l_N)(l_N + x_N) \right), \quad (2.9)$$

где

$$\widetilde{M} = \frac{M}{\frac{3}{2}l_N^2 + l_N + \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K (\frac{3}{2}l_i^2 + \delta l_i)}. \quad (2.10)$$

Если $K = N$, то полагаем

$$r(\mathbf{x}) = 0, \quad \widetilde{M} = \frac{M}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\frac{3}{2}l_i^2 + \delta l_i)}.$$

Нетрудно установить следующие свойства функций $\sigma(\mathbf{x})$ и $r(\mathbf{x})$:

$$\sigma(\mathbf{x}) \geq 0, \quad r(\mathbf{x}) \geq 0 \quad \forall x \in \overline{\Omega}, \quad (2.11)$$

$$\frac{\widetilde{M}}{K} \delta \leq \sigma_{x_i} = \frac{\widetilde{M}}{K} (-x_i + \delta + l_i) \leq \frac{\widetilde{M}}{K} (2l_i + \delta), \quad i = 1, \dots, K, \quad (2.12)$$

$$(\sigma_{x_i})^{p_i-2} \geq \left(\frac{\widetilde{M}}{K} \right)^{p_i-2} (2l_i + \delta)^{p_i-2}, \quad \sigma_{x_i x_i} = -\frac{\widetilde{M}}{K}, \quad i = 1, \dots, K, \quad (2.13)$$

$$r_{x_N} = \widetilde{M}(-x_N + 1 + l_N) \geq \widetilde{M}, \quad (r_{x_N})^{p_N-1} \geq \widetilde{M}^{p_N-1}, \quad r_{x_N x_N} = -\widetilde{M}. \quad (2.14)$$

Перейдем теперь к доказательству априорной оценки регуляризованной задачи.

Лемма 2.2. *Предположим, что условия (1.3), (1.7) выполнены. Тогда существует $\delta_0 > 0$ такое, что при всех $\varepsilon \leq \varepsilon_0 = (1 + \alpha - \alpha_0) \left(\frac{\widetilde{M}}{K} \delta_0 \right)^\alpha$ для любого классического решения задачи (2.1), (1.2) имеет место следующая оценка:*

$$|u(\mathbf{x})| \leq M_{\delta_0}. \quad (2.15)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Введем оператор

$$Lu \equiv - \sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i}) u_{x_i x_i}.$$

Тогда (2.3) примет вид

$$L(u) = c_\varepsilon(\mathbf{x}) g_M(u) + f_\varepsilon(\mathbf{x}). \quad (2.16)$$

Положим $H(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{x}) + r(\mathbf{x})$. Из леммы 2.1 и формул (2.13), (2.14) вытекает, что

$$\begin{aligned} -a_{i\varepsilon}(H_{x_i})H_{x_i x_i} &= \mu_i(H_{x_i}^\alpha + \varepsilon)^{\frac{p_i-2}{\alpha}-1}((p_i-1)H_{x_i}^\alpha + \varepsilon)|H_{x_i x_i}| \\ &\geq \mu_i(p_i-1)|H_{x_i}|^{p_i-2}|H_{x_i x_i}|, \quad i = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad (2.17)$$

Действительно, в силу условий (2.12), (2.14) функции $a_{i\varepsilon}(H_{x_i}(\mathbf{x}))$, $i = 1, \dots, N$, удовлетворяют условиям леммы 2.1 для любых \widetilde{M} , $\delta > 0$, если выбрать $\varepsilon \leq \varepsilon_0 = (1 + \alpha - \alpha_0)(\frac{\widetilde{M}}{K}\delta)^\alpha$. Используя свойства (2.11)–(2.14), получаем

$$-a_{i\varepsilon}(H_{x_i})H_{x_i x_i} = -a_{i\varepsilon}(\sigma_{x_i})\sigma_{x_i x_i} \geq \mu_i(p_i-1)(2l_i + \delta)^{p_i-2} \left(\frac{\widetilde{M}}{K}\right)^{p_i-1}, \quad i = 1, \dots, K, \quad (2.18)$$

$$-a_{i\varepsilon}(H_{x_i})H_{x_i x_i} = 0, \quad i = K + 1, \dots, N - 1, \quad (2.19)$$

$$-a_{i\varepsilon}(H_{x_N})H_{x_N x_N} = -a_{i\varepsilon}(r_{x_N})r_{x_N x_N} \geq \mu_N(p_N - 1)\widetilde{M}^{p_N-1}. \quad (2.20)$$

Из (2.18) следует, что

$$\begin{aligned} -\sum_{i=1}^K a_{i\varepsilon}(H_{x_i})H_{x_i x_i} &= -\sum_{i=1}^K a_{i\varepsilon}(\sigma_{x_i})\sigma_{x_i x_i} \geq \sum_{i=1}^K \mu_i(p_i-1)(2l_i + \delta)^{p_i-2} \left(\frac{\widetilde{M}}{K}\right)^{p_i-1} \\ &\geq K \left(\prod_{i=1}^K \mu_i(p_i-1)(2l_i + \delta)^{p_i-2} \left(\frac{\widetilde{M}}{K}\right)^{p_i-1} \right)^{\frac{1}{K}} \\ &\geq K \left(\prod_{i=1}^K \mu_i(p_i-1)(2l_i + \delta)^{p_i-2} \right)^{\frac{1}{K}} \frac{\widetilde{M}^{\sum_{i=1}^K p_i - K}}{K^{\sum_{i=1}^K p_i - K}} \\ &= \left(\prod_{i=1}^K \mu_i(p_i-1)(2l_i + \delta)^{p_i-2} \right)^{\frac{1}{K}} K^{2-\bar{p}_\sigma} \widetilde{M}^{\bar{p}_\sigma-1}, \quad \bar{p}_\sigma = \frac{\sum_{i=1}^K p_i}{K}. \end{aligned} \quad (2.21)$$

Принимая во внимание соотношения (2.18)–(2.21) и обозначения (1.6), (2.10), заключаем, что

$$L(H) = -\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(H_{x_i})H_{x_i x_i} \geq A(\delta)K^{2-\bar{p}_\sigma} M^{\bar{p}_\sigma-1} + B(\delta)M^{p_N-1}. \quad (2.22)$$

Рассмотрим функцию $v(\mathbf{x}) \equiv u(\mathbf{x}) - H(\mathbf{x})$. Очевидно,

$$\begin{aligned} L(u) - L(H) &= -\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i})u_{x_i x_i} + \sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(H_{x_i})H_{x_i x_i} \\ &= -\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i})v_{x_i x_i} + \sum_{i=1}^N (a_{i\varepsilon}(H_{x_i}) - a_{i\varepsilon}(u_{x_i}))H_{x_i x_i}. \end{aligned}$$

С другой стороны, в силу (2.16), (2.22)

$$\begin{aligned} L(u) - L(H) &= c_\varepsilon(\mathbf{x})g_M(u) + f_\varepsilon(\mathbf{x}) - L(H) \\ &\leq c_\varepsilon(\mathbf{x})g_M(u) + f_\varepsilon(\mathbf{x}) - A(\delta)K^{2-\bar{p}_\sigma} M^{\bar{p}_\sigma-1} - B(\delta)M^{p_N-1}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$-\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i})v_{x_i x_i} \leq \sum_{i=1}^N (a_{i\varepsilon}(u_{x_i}) - a_{i\varepsilon}(H_{x_i}))H_{x_i x_i} + c_\varepsilon(\mathbf{x})g_M(u) + f_\varepsilon(\mathbf{x}) - A(\delta)K^{2-\bar{p}_\sigma}M^{\bar{p}_\sigma-1} - B(\delta)M^{p_N-1}. \quad (2.23)$$

Предположим, что в точке $X \in \Omega$ функция $v(\mathbf{x})$ достигает своего положительного максимума. Тогда в этой точке имеем

$$v > 0, \quad u > H \geq 0, \quad v_{x_i} = 0, \quad v_{x_i x_i} \leq 0, \quad i = 1, \dots, N.$$

Из последних двух соотношений вытекает, что

$$u_{x_i} = H_{x_i}, \quad i = 1, \dots, N, \quad \sum_{i=1}^N (a_{i\varepsilon}(u_{x_i}) - a_{i\varepsilon}(H_{x_i}))H_{x_i x_i} = 0.$$

Более того,

$$-\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i})v_{x_i x_i}|_X \geq 0.$$

С другой стороны,

$$-\sum_{i=1}^n a_{i\varepsilon}(u_{x_i})v_{x_i x_i}|_X \leq c_\varepsilon(\mathbf{x})g_M(u) + f_\varepsilon(\mathbf{x}) - A(\delta)K^{2-\bar{p}_\sigma}M^{\bar{p}_\sigma-1} - B(\delta)M^{p_N-1}|_X \leq c_0g(M) + f_0 - A(\delta)K^{2-\bar{p}_\sigma}M^{\bar{p}_\sigma-1} - B(\delta)M^{p_N-1}. \quad (2.24)$$

Здесь используется тот факт, что для положительных u имеем $0 < g_M(u) \leq g(M)$. Рассмотрим последний член в выражении (2.24). Для того чтобы получить желаемое противоречие, покажем, что имеет место следующее неравенство:

$$c_0g(M) + f_0 - A(\delta)K^{2-\bar{p}_\sigma}M^{\bar{p}_\sigma-1} - B(\delta)M^{p_N-1} < 0. \quad (2.25)$$

Запишем (2.25) в виде

$$\frac{1}{A(\delta)}(c_0g(M)M^{1-\bar{p}_\sigma} - B(\delta)M^{p_N-\bar{p}_\sigma} + f_0M^{1-\bar{p}_\sigma}) < K^{2-\bar{p}_\sigma}. \quad (2.26)$$

Положим

$$F(M, \delta) \equiv \frac{1}{A(\delta)}(c_0g(M)M^{1-\bar{p}_\sigma} - B(\delta)M^{p_N-\bar{p}_\sigma} + f_0M^{1-\bar{p}_\sigma}).$$

В силу предположения о том, что функция $g(u)$ удовлетворяет неравенству вида $|g(u)| > C|u|^{p_N-1}$ при $|u| \geq u_0$, где u_0 — некоторая положительная константа, а $C = \frac{B(\delta)}{c_0}$, вытекает, что

$$\lim_{M \rightarrow 0} F(M, \delta) = \lim_{M \rightarrow \infty} F(M, \delta) = \infty \quad \text{для любого } \delta \geq 0,$$

следовательно, для каждого фиксированного $\delta \geq 0$ функция $F(M, \delta)$ достигает своего минимума на интервале $(0, \infty)$. Обозначим через M_0 точку, в которой достигает своего минимума функция $F(M, 0)$. Заметим, что $F(M, \delta)$ является возрастающей по δ функцией и, следовательно, $F(M_0, 0) \leq F(M, 0) < F(M, \delta)$

для всех $\delta > 0$. В силу непрерывности функции $F(M, \delta)$ если $F(M_0, 0) < K^{2-\bar{p}\sigma}$, то существует такое δ_0 , что имеет место следующее неравенство:

$$F(M_0, 0) < F(M_0, \delta_0) < K^{2-\bar{p}\sigma}. \quad (2.27)$$

Таким образом, из соотношений (1.7), (2.24)–(2.27) при $\delta = \delta_0$ и всех $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ вытекает, что

$$-\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i})v_{x_i x_i}|_X < 0.$$

Это противоречит предположению о том, что функция $v(\mathbf{x})$ достигает положительного максимума в точке X . В силу однородных краевых условий на границе $\partial\Omega$ имеем $v = -H \leq 0$. Учитывая тот факт, что $v(\mathbf{x})$ не может достигать положительного максимума внутри области Ω , заключаем, что

$$v(\mathbf{x}) \leq 0 \quad \text{или} \quad u(\mathbf{x}) \leq H(\mathbf{x}) \quad \text{в} \quad \bar{\Omega}.$$

Получим теперь оценку снизу. Рассмотрим функцию $w(\mathbf{x}) \equiv u(\mathbf{x}) + H(\mathbf{x})$. Легко видеть, что

$$\begin{aligned} L(u) + L(H) &= -\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i})u_{x_i x_i} - \sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(H_{x_i})H_{x_i x_i} \\ &= -\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i})w_{x_i x_i} - \sum_{i=1}^N (a_{i\varepsilon}(H_{x_i}) - a_{i\varepsilon}(u_{x_i}))H_{x_i x_i}. \end{aligned}$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} L(u) + L(H) &= c_\varepsilon(\mathbf{x})g_M(u) + f_\varepsilon(\mathbf{x}) + L(H) \\ &\geq c_\varepsilon(\mathbf{x})g_M(u) + f_\varepsilon(\mathbf{x}) + A(\delta)K^{2-\bar{p}\sigma}M^{\bar{p}\sigma-1} + B(\delta)M^{PN-1}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} -\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i})w_{x_i x_i} &\geq \sum_{i=1}^N (a_{i\varepsilon}(H_{x_i}) - a_{i\varepsilon}(u_{x_i}))H_{x_i x_i} \\ &\quad + c_\varepsilon(\mathbf{x})g_M(u) + f_\varepsilon(\mathbf{x}) + A(\delta)K^{2-\bar{p}\sigma}M^{\bar{p}\sigma-1} + B(\delta)M^{PN-1}. \end{aligned}$$

Предположим, что в некоторой точке $X_1 \in \Omega$ функция $w(\mathbf{x})$ достигает отрицательного минимума. Тогда в этой точке

$$w < 0, \quad u < -H \leq 0, \quad w_{x_i} = 0, \quad w_{x_i x_i} \geq 0, \quad i = 1, \dots, N. \quad (2.28)$$

В силу выбора постоянной α коэффициенты $a_{i\varepsilon}(z)$ удовлетворяют равенствам $a_{i\varepsilon}(z) = a_{i\varepsilon}(-z)$, $i = 1, \dots, N$. Из последних двух соотношений в (2.28) вытекает, что в точке X_1 выполняются следующие равенства:

$$u_{x_i} = -H_{x_i}, \quad i = 1, \dots, N, \quad \sum_{i=1}^N (a_{i\varepsilon}(H_{x_i}) - a_{i\varepsilon}(u_{x_i}))H_{x_i x_i} = 0. \quad (2.29)$$

Более того,

$$-\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i})v_{x_i x_i}|_{X_1} \leq 0.$$

В то же время легко видеть, что в силу (2.29)

$$\begin{aligned} -\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i})w_{x_i x_i}|_{X_1} &\geq c_\varepsilon(\mathbf{x})g_M(u) + f_\varepsilon(\mathbf{x}) + A(\delta)K^{2-\bar{p}\sigma}M^{\bar{p}\sigma-1} + B(\delta)M^{pN-1}|_{X_1} \\ &\geq -c_0g(M) - f_0 + A(\delta)K^{2-\bar{p}\sigma}M^{\bar{p}\sigma-1} + B(\delta)M^{pN-1}. \end{aligned} \quad (2.30)$$

Здесь использовано неравенство $c_\varepsilon(X_1)g_M(u(X_1)) \geq -c_0g(M)$. Если $c_\varepsilon(X_1) \geq 0$, то последнее неравенство вытекает из того, что $g_M(u) \geq -g(M)$. Если же $c_\varepsilon(X_1) < 0$, то это неравенство есть следствие того факта, что $g_M(u) \leq g(M)$. Стало быть, из (1.7), (2.27), (2.30) получаем, что при всех $\varepsilon \leq \varepsilon_0$

$$-\sum_{i=1}^N a_{i\varepsilon}(u_{x_i})w_{x_i x_i}|_{X_1} > 0.$$

Это противоречит предположению о том, что функция $v(\mathbf{x})$ достигает отрицательного минимума в точке X_1 .

В силу однородности краевых условий на границе $\partial\Omega$ имеем $w = H \geq 0$. Учитывая тот факт, что $w(\mathbf{x})$ не может иметь отрицательный минимум внутри области Ω , заключаем, что

$$w(\mathbf{x}) \geq 0 \text{ или } u(\mathbf{x}) \geq -H(\mathbf{x}) \text{ в } \bar{\Omega}.$$

Следовательно,

$$-H(\mathbf{x}) \leq u(\mathbf{x}) \leq H(\mathbf{x}). \quad (2.31)$$

Используя функцию $\tilde{H}(\mathbf{x}) \equiv H(-\mathbf{x})$ вместо $H(\mathbf{x})$, можно показать, что также имеет место оценка

$$-\tilde{H}(\mathbf{x}) \leq u(\mathbf{x}) \leq \tilde{H}(\mathbf{x}). \quad (2.32)$$

Эта оценка с небольшими изменениями, которые сейчас отметим, может быть получена аналогично тому, как была получена оценка (2.31). Рассмотрим функцию

$$\begin{aligned} \tilde{H}(\mathbf{x}) &= \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \tilde{M} \left(\frac{l_i^2 - x_i^2}{2} + (\delta + l_i)(l_i - x_i) \right) \\ &\quad + \tilde{M} \left(\frac{l_N^2 - x_N^2}{2} + (1 + l_N)(l_N - x_N) \right). \end{aligned}$$

Легко показать, что $\tilde{H}_{x_i x_i}(\mathbf{x}) = -\frac{\tilde{M}}{K}$, $i = 1, \dots, K$, $\tilde{H}_{x_i x_i}(\mathbf{x}) = 0$, $i = K + 1, \dots, N - 1$, $\tilde{H}_{x_N x_N}(\mathbf{x}) = -\tilde{M}$, а также

$$-(2l_i + \delta)\frac{\tilde{M}}{K} \leq \tilde{H}_{x_i}(\mathbf{x}) \leq -\delta\frac{\tilde{M}}{K}, \quad i = 1, \dots, K, \quad \tilde{H}_{x_N}(\mathbf{x}) \leq -\frac{\tilde{M}}{K}.$$

В силу выбора постоянной α заключаем, что

$$(\delta)^\alpha \left(\frac{\tilde{M}}{K} \right)^\alpha \leq \tilde{H}_{x_i}^\alpha(\mathbf{x}) \leq (2l_i + \delta)^\alpha \left(\frac{\tilde{M}}{K} \right)^\alpha, \quad \tilde{H}_{x_N}^\alpha \geq (\tilde{M})^\alpha.$$

Из леммы 2.1 легко получить оценки, подобные оценкам (2.18)–(2.20). Используя (2.27), (2.31) и (2.32) приходим к оценке

$$|u(\mathbf{x})| \leq H(0) = \tilde{H}(0) = \left[\frac{3l_N^2}{2} + l_N + \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \left(\frac{3l_i^2}{2} + \delta_0 l_i \right) \right] \tilde{M} = M_0, \quad (2.33)$$

$$|u(\mathbf{x})| \leq \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{3l_i^2}{2} + \delta_0 l_i \right) \right] \widetilde{M} = M_0 \quad \text{при } K = N,$$

где $M_0 \in \mathfrak{F}_{\delta_0}$. Очевидно, что для любой точки $M \in \mathfrak{F}_{\delta_0}$ имеет место неравенство (2.27). Следовательно, для любого достаточно малого $\eta > 0$ получаем оценку $|u(\mathbf{x})| \leq M = M_{\delta_0} + \eta$, откуда немедленно вытекает окончательная оценка

$$|u(\mathbf{x})| \leq M_{\delta_0}. \tag{2.34}$$

Лемма 2.2 доказана. \square

§ 3. Теорема существования решения исходной задачи

Используя результаты § 2, докажем теорему 1.1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1.1. Классическая разрешимость регуляризованной задачи вытекает из леммы 2.2, а также из лемм 2, 3 в [29], согласно известным результатам, касающимся разрешимости задачи Дирихле для нелинейных эллиптических уравнений [18]. Заметим, что в леммах 2, 3 из [29] доказываются априорные оценки градиента решения для задачи (2.1), (1.2). Для того чтобы доказать существование обобщенного решения исходной задачи, необходимо осуществить предельный переход по ε в регуляризованной задаче. Возможность такого предельного перехода доказана в теореме 1 из [30] для случая $p_i \geq 2, i = 1, \dots, N$. В сингулярном случае доказательство предельного перехода проводится аналогичным образом, поэтому приводить его в данной статье считаем излишним.

Докажем теперь, что для обобщенного решения, полученного предельным переходом, имеет место оценка $|u(\mathbf{x})| \leq M_*$. Действительно, из леммы 2.2 следует, что для всех $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ решение u_ε регуляризованной задачи удовлетворяет оценке $|u_\varepsilon(\mathbf{x})| \leq M_{\delta_0} = \inf \mathfrak{F}_{\delta_0}$. Также из леммы 2.2 и леммы 3 из [30] вытекает, что существует подпоследовательность, которую мы обозначим через $u_{\varepsilon_n}(\mathbf{x})$, такая, что $u_{\varepsilon_n}(\mathbf{x}) \rightarrow u(\mathbf{x})$ при $\varepsilon_n \rightarrow 0, \varepsilon_n \leq \varepsilon_0$, равномерно по норме пространства C_0 . Из (2.27) и монотонности функции $F(M, \delta)$ по δ получаем, что (2.27) имеет место для любого $\delta \leq \delta_0$. Положим

$$\delta_n = \frac{K}{M_0} \left(\frac{\varepsilon_n}{1 + \alpha - \alpha_0} \right)^{\frac{1}{\alpha}}, \quad n = 0, \dots, \tag{3.1}$$

причем легко видеть, что $\delta_n \leq \delta_0, \delta_n \rightarrow 0$ при $\varepsilon_n \rightarrow 0$ и

$$|u_{\varepsilon_n}(\mathbf{x})| \leq M_{\delta_n} = \inf \mathfrak{F}_{\delta_n}, \quad |u_{\varepsilon_m}(\mathbf{x})| \leq M_{\delta_n} = \inf \mathfrak{F}_{\delta_n}, \quad m \geq n. \tag{3.2}$$

Таким образом, для функции $u(\mathbf{x}) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{\varepsilon_n}(\mathbf{x})$ будет выполняться

$$\|u(\mathbf{x})\|_{L^\infty} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} M_{\delta_n} = M_* = \inf \mathfrak{F}. \quad \square$$

ЗАМЕЧАНИЕ 2.1. Рассмотрим следующую задачу Дирихле:

$$-\sum_{i=1}^N (|u_{x_i}|^{p-2} u_{x_i})_{x_i} = \lambda |u|^{p-2} u + f(\mathbf{x}) \quad \text{в } \Omega \subset \mathbb{R}^N, \tag{3.3}$$

$$u = 0 \quad \text{на } \partial\Omega. \tag{3.4}$$

Здесь $q = p - 1, \bar{p}_\sigma = p, g(u) = |u|^{p-2} u$. Заметим, что при $f(\mathbf{x}) \equiv 0$ эту задачу можно рассматривать как задачу на собственные значения. Поскольку

$g(u) = |u|^{p-2}u$ является неубывающей функцией, задача (3.3), (3.4) разрешима для любой $f(\mathbf{x}) \in L^\infty$ при $\lambda \leq 0$. Как всегда, предполагаем, что $f(\mathbf{x})$ отлична от тождественного нуля. Пусть $\lambda > 0$ и $1 < p < 2$. Функция $F(M, 0)$ в данном случае принимает вид

$$F(M, 0) = \frac{1}{A(0)}(\lambda + f_0 M^{1-p}).$$

Из леммы 2.2 вытекает, что задача (3.3), (3.4) разрешима, если существует такое M , что $F(M, 0) = \frac{1}{A(0)}(\lambda + f_0 M^{1-p}) < N^{2-p}$. Легко видеть, что для любой функции $f(\mathbf{x}) \in L^\infty$ имеем $\inf F(M, 0) = \lim_{M \rightarrow \infty} F(M, 0) = \frac{1}{A(0)}\lambda$. Таким образом, условие (1.7) можно переписать в виде

$$\inf F(M, 0) = \frac{1}{A(0)}\lambda < N^{2-p}. \quad (3.5)$$

Действительно, если неравенство (3.5) выполнено, то существует такое M , что также имеет место и неравенство $F(M, 0) = \frac{1}{A(0)}(\lambda + f_0 M^{1-p}) < N^{2-p}$. Отсюда следует, что задача (3.3), (3.4) разрешима для любой $f(\mathbf{x}) \in L^\infty$ при $\lambda < A(0)N^{2-p}$. Если зафиксировать $\max_{1 \leq i \leq N} l_i \leq \text{const}$, то можно считать, что $A(0) \geq A_0$ для любого N . При таких предположениях становится ясно, что задача (3.3), (3.4) разрешима для любого λ при соответствующем выборе размерности.

Стоит отметить, что наш результат применим также к параболическому аналогу уравнения (1.1). Рассмотрим начально-краевую задачу для параболического аналога уравнения (1.1):

$$u_t - \sum_{i=1}^N (|u_{x_i}|^{p_i-2} u_{x_i})_{x_i} = \lambda g(u) + f(\mathbf{x}, t) \quad \text{в } Q_T = \Omega \subset \mathbb{R}^N \times (0, T), \quad (3.6)$$

$$u = 0 \quad \text{на } \partial\Omega \times (0, T), \quad (3.7)$$

$$u(\mathbf{x}, 0) = u_0(\mathbf{x}) \quad \text{в } \Omega. \quad (3.8)$$

В [29] доказано существование ограниченного обобщенного решения задачи (3.6)–(3.8) при условии, что g является непрерывной функцией, удовлетворяющей условию (1.3), $f \in L^\infty(Q_T)$, Ω удовлетворяет условию внешней сферы и существует положительная постоянная M такая, что

$$(\lambda g(M+m) + f_0) \left(\frac{3l^2 + 2l}{2} \right)^{p-1} < (p-1)M^{p-1}, \quad (3.9)$$

где $p = p_{i_0} = \max\{p_1, \dots, p_N\}$, $l = l_{i_0}$, $f_0 = \|f(\mathbf{x})\|_{L^\infty}$, $m = \|u_0\|_{L^\infty}$. Легко показать, что аналогичный результат о разрешимости имеет место в случае, если условие (3.9) заменить слегка видоизмененным условием (1.7)

$$\tilde{F}(M_0, 0) < K^{2-\bar{p}\sigma}, \quad (3.10)$$

где

$$\tilde{F}(M, \delta) \equiv \frac{1}{A(\delta)}(\lambda g(M+m)M^{1-\bar{p}\sigma} - B(\delta)M^{pN-\bar{p}\sigma} + f_0 M^{1-\bar{p}\sigma})$$

и M_0 — точка минимума функции $\tilde{F}(M, 0)$. Отметим, что при выводе априорной оценки (2.15) мы не накладывали условие (A) на границу области Ω .

ЛИТЕРАТУРА

1. Alberico A., Cianchi A. Comparison estimates in anisotropic variational problems // *Manuscripta Math.* 2008. V. 124, N 4. P. 481–503.
2. Alves C. O., Hamidi A. El. Existence of solution for a anisotropic equation with critical exponent // *Differ. Integral Equ.* 2008. V. 21, N 1. P. 25–40.
3. Антонцев С. Н., Шмарев С. И. О локализации решений эллиптических уравнений с неоднородным анизотропным вырождением // *Сиб. мат. журн.* 2005. Т. 46, № 5. С. 963–984.
4. Antontsev S., Shmarev S. Elliptic equations and systems with nonstandard growth conditions: Existence, uniqueness and localization properties of solutions // *Nonlinear Anal.* 2006. V. 65, N 4. P. 728–761.
5. Antontsev S., Shmarev S. Elliptic equations with anisotropic nonlinearity and nonstandard growth conditions // *Handbook of differential equations. stationary partial differential equations.* Amsterdam: Elsevier / North Holland, 2006. V. 3. P. 1–100.
6. Antontsev S., Shmarev S. Anisotropic parabolic equations with variable nonlinearity // *Publ. Mat.* 2009. V. 53, N 2. P. 355–399.
7. Antontsev S., Shmarev S. Localization solutions of anisotropic parabolic equations // *Nonlinear Anal.* 2009. V. 71, N 12. P. e725–e737.
8. Bendahmane M., Karlsen K. H. Renormalized solutions of an anisotropic reaction-diffusion-advection system with L1 data // *Commun. Pure Appl. Anal.* 2006. V. 5, N 4. P. 733–762.
9. Bendahmane M., Karlsen K. H. Nonlinear anisotropic elliptic and parabolic equations in R^N with advection and lower order terms and locally integrable data // *Potential Anal.* 2005. V. 22, N 3. P. 207–227.
10. Bendahmane M., Karlsen K. H. Anisotropic nonlinear elliptic systems with measure data and anisotropic harmonic maps into spheres // *Electron. J. Differ. Equ.* 2006. V. 46. 30 p.
11. Bendahmane M., Langlais M., Saad M. On some anisotropic reaction-diffusion systems with L1-data modeling the propagation of an epidemic disease // *Nonlinear Anal.* 2003. V. 54, N 4. P. 617–636.
12. Cianchi A. Symmetrization in anisotropic elliptic problems // *Comm. Partial Differ. Equ.* 2007. V. 32, N 4–6. P. 693–717.
13. D’Ambrosio L. Liouville theorems for anisotropic quasilinear inequalities // *Nonlinear Anal.* 2009. V. 70, N 8. P. 2855–2869.
14. Di Castro A., Montefusco E. Nonlinear eigenvalues for anisotropic quasilinear degenerate elliptic equations // *Nonlinear Anal.* 2009. V. 70, N 11. P. 4093–4105.
15. Fragala I., Gazzola F., Kawohl B. Existence and nonexistence results for anisotropic quasilinear elliptic equations // *Ann. Inst. Henri Poincaré, Anal. Non Linéaire.* 2004. V. 21, N 5. P. 715–734.
16. Fragala I., Gazzola F., Lieberman G. Regularity and nonexistence results for anisotropic quasilinear elliptic equations in convex domains // *Discrete Contin. Dyn. Syst. (suppl.)*. 2005. P. 280–286.
17. Garcia-Melian J., Rossi J. D., de Lis J. C. S. Large solutions to an anisotropic quasilinear elliptic problem // *Ann. Mat. Pura Appl.* 2010. V. 189, N 4. P. 689–712.
18. Gilbarg D., Trudinger N. Elliptic partial differential equations of second order. Berlin: Springer-Verl., 1983.
19. El Hamidi A., Rakotoson J.-M. On a perturbed anisotropic equation with a critical exponent // *Ric. Mat.* 2006. V. 55, N 1. P. 55–69.
20. El Hamidi A., Rakotoson J.-M. Extremal functions for the anisotropic Sobolev inequalities // *Ann. Inst. Henri Poincaré, Anal. Non Linéaire.* 2007. V. 24, N 5. P. 741–756.
21. El Hamidi A., Vetois J. Sharp Sobolev asymptotics for critical anisotropic equations // *Arch. Ration. Mech. Anal.* 2009. V. 192, N 1. P. 1–36.
22. Li J. J. Local behaviour of solutions of anisotropic elliptic equations // *Nonlinear Anal.* 1999. V. 35, N 5. P. 617–628.
23. Liang Z. The role of space dimension on the blow-up for a reaction-diffusion equation // *Appl. Math.* 2011. V. 2, N 5. P. 575–578.
24. Lieberman G. M. Gradient estimates for a new class of degenerate elliptic and parabolic equations // *Ann. Sc. Norm. Super. Pisa, Cl. Sci. IV Ser.* 1994. V. 21, N 4. P. 497–522.
25. Lieberman G. M. Gradient estimates for anisotropic elliptic equations // *Adv. Differ. Equ.* 2005. V. 10, N 7. P. 767–812.
26. Mihailescu M., Pucci P., Radulescu V. Nonhomogeneous boundary value problems in anisotropic Sobolev spaces // *C. R. Math. Acad. Sci. Paris.* 2007. V. 345, N 10. P. 561–566.

27. *Mihailescu M., Pucci P., Radulescu V.* Eigenvalue problems for anisotropic quasilinear elliptic equations with variable exponent // *J. Math. Anal. Appl.* 2008. V. 340, N 1. P. 687–698.
28. *Mihailescu M., Radulescu V., Tersian S.* Eigenvalue problems for anisotropic discrete boundary value problem // *J. Differ. Equ. Appl.* 2009. V. 15, N 6. P. 557–567.
29. *Starovoitov V., Tersenov Al. S.* Singular and degenerate anisotropic parabolic equations with a nonlinear source // *Nonlinear Anal.* 2010. V. 72, N 6. P. 3009–3027.
30. *Tersenov Al., Tersenov Ar.* The problem of Dirichlet for anisotropic quasilinear degenerate elliptic equations // *J. Differ. Equ.* 2007. V. 235, N 2. P. 376–396.
31. *Vetois J.* Asymptotic stability convexity and Lipschitz regularity of domains in the anisotropic regime // *Commun. Contemp. Math.* 2010. V. 12, N 1. P. 35–53.
32. *Vetois J.* A priori estimates for solutions of anisotropic elliptic equations // *Nonlinear Anal.* 2009. V. 71, N 9. P. 3881–3905.
33. *Vetois J.* The blow-up of critical anisotropic equations with critical directions // *Nonlinear Differ. Equ. Appl.* 2011. V. 18, N 2. P. 173–197.

Статья поступила 13 июля 2011 г.

Терсенов Арис Саввич
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090
aterseno@math.nsc.ru