

УДК 517.956.22

## НЕТРИВИАЛЬНАЯ РАЗРЕШИМОСТЬ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ДИВЕРГЕНТНОГО ТИПА С КОМПЛЕКСНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

А. И. Ноаров

**Аннотация.** На торе рассматривается стационарное уравнение Фоккера — Планка — Колмогорова с комплексными коэффициентами диффузии и комплексным векторным полем. При подходящих условиях на коэффициенты диффузии доказывается существование решения, отличного от тождественного нуля. В ряде случаев устанавливается многомерность пространства решений.

**Ключевые слова:** стационарное уравнение Фоккера — Планка — Колмогорова, разложение Вейля.

На торе  $T$ , представляющем собой куб  $[0; 1]^n$ , у которого «склеены» противоположные грани, рассмотрим следующие уравнения:

$$\sum_{l,k=1}^n \frac{\partial}{\partial x_k} \left( a_{l,k}(\mathbf{x}) \frac{\partial U(x)}{\partial x_l} \right) = \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}), \quad (1)$$

$$\sum_{l,k=1}^n \frac{\partial}{\partial x_k} \left( a_{l,k}(\mathbf{x}) \frac{\partial U(x)}{\partial x_l} \right) - \operatorname{div}(U(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x})) = 0. \quad (2)$$

Целью данной работы является доказательство разрешимости уравнения (1) и нетривиальной разрешимости уравнения (2) с заданными на торе  $T$  комплексными коэффициентами  $a_{l,k}(\mathbf{x})$  и векторными полями  $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ ,  $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ .

В основе нашего подхода лежит следующее наблюдение. Функционально-дифференциальное уравнение

$$\Delta u - \operatorname{div}(\mathbf{P}(u)) = 0 \quad (3)$$

разрешимо для широкого класса операторов  $\mathbf{P}$ , переводящих числовую функцию в векторное поле. Примерами здесь могут служить уравнение  $\Delta u - \operatorname{div}(u\mathbf{f}) = 0$  (см. [1–3]), а также функционально-дифференциальное уравнение  $\Delta u(\mathbf{x}) - \operatorname{div}(u(H(\mathbf{x}))\mathbf{f}(\mathbf{x})) = 0$  (см. [4]). В первом примере линейный оператор  $\mathbf{P}$  умножает функцию на заданное векторное поле  $\mathbf{f}$ . Этот оператор (как третий шаг соответствующих алгоритмов) фигурировал в [1–3] в различных функциональных пространствах, в [1, 2] он вместе с  $\mathbf{f}$  считался «малым». Для второго примера оператор  $u(\mathbf{x}) \mapsto u(H(\mathbf{x}))\mathbf{f}(\mathbf{x})$  из [4] мог трактоваться как компактное отображение из  $W_2^1(T)$  в  $L^2(T)$ . Во всех указанных случаях доказана нетривиальная разрешимость (3).

В применении к уравнению (1) описанный метод реализуется в теореме 1, где матрица  $a_{l,k}(\mathbf{x})$  считается «близкой к единичной», уравнение (1) принимает

вид (3), а непрерывный оператор  $\mathbf{P}$  из  $W_2^1(T)$  в  $L^2(T)$  дается третьим шагом алгоритма. Далее получаются различные утверждения о разрешимости (1), обобщающие разложение Вейля. Наконец, теорема 4 осуществляет переход от уравнения (1) к уравнению (2).

Введем пространство  $L^2(T)$  комплексных векторных полей на торе  $T$  со скалярным произведением

$$(\mathbf{g}, \mathbf{h}) = \sum_{j=1}^n \int_T g_j(\mathbf{x}) \bar{h}_j(\mathbf{x}) dx_1 \dots dx_n$$

и нормой  $\|\mathbf{h}\| = (\mathbf{h}, \mathbf{h})^{1/2}$ . Напомним (см. [1, 2, 4, 5]), что имеет место ортогональное разложение Вейля  $L^2(T) = \mathbf{G}(T) \oplus \mathbf{J}(T)$ . Здесь  $\mathbf{G}(T)$  — множество градиентов всех функций из  $L^2(T)$ , имеющих первые производные из  $L^2(T)$ , а  $\mathbf{J}(T)$  — замыкание в  $L^2(T)$  множества всех векторных полей из  $W_2^1(T)$  с нулевой дивергенцией. Это разложение  $\mathbf{f}_1 = \nabla U + (\mathbf{f}_1 - \nabla U)$  сводится к решению уравнения  $\Delta U = \operatorname{div} \mathbf{f}_1$ , понимаемого в смысле теории распределений.

**Теорема 1.** Пусть измеримая комплексная матричнозначная функция  $\{b_{l,k}(\mathbf{x})\}_{l,k=1}^n$  на торе  $T$  при каждом  $\mathbf{x} \in T$  определяет оператор, сжимающий  $\mathbb{C}^n$  равномерно по  $\mathbf{x}$ :

$$\sup_{x \in T, \xi \in \mathbb{C}} \sum_{k=1}^n \left| \sum_{l=1}^n b_{l,k}(\mathbf{x}) \xi_l \right|^2 / \sum_{k=1}^n |\xi_k|^2 = \eta^2 < 1, \quad \eta \geq 0. \quad (4)$$

Тогда при всяком комплексном векторном поле  $\mathbf{F} \in L^2(T)$  существует обобщенное решение  $U(\mathbf{x})$  уравнения

$$\Delta U(\mathbf{x}) - \sum_{l,k=1}^n \frac{\partial}{\partial x_k} \left( b_{l,k}(\mathbf{x}) \frac{\partial U(\mathbf{x})}{\partial x_l} \right) = \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \quad (5)$$

в следующем смысле:  $U \in W_2^1(T)$ ,  $\mathbf{J}(T)$  содержит сумму векторного поля  $\mathbf{F}(\mathbf{x}) - \nabla U(\mathbf{x})$  и векторного поля,  $k$ -я компонента которого равна  $\sum_{l=1}^n b_{l,k}(\mathbf{x}) \frac{\partial U(\mathbf{x})}{\partial x_l}$ . Такое решение  $U$  при дополнительном условии  $\int_T U(\mathbf{x}) dx_1 \dots dx_n = 0$  существует, единственно и удовлетворяет неравенству

$$\|\nabla U\| \leq \|\mathbf{F}\| / (1 - \eta). \quad (6)$$

**Доказательство.** Определим отображение  $B$  пространства  $L^2(T)$  комплексных векторных полей в себя, ставящее в соответствие всякому векторному полю  $\mathbf{f}_1$  векторное поле  $\mathbf{f}_2$  по следующему алгоритму.

1. Векторное поле  $\mathbf{f}_1$  разложим на две составляющие:  $\mathbf{f}_1 = \mathbf{j} + \mathbf{g}$ ,  $\mathbf{j} \in \mathbf{J}(T)$ ,  $\mathbf{g} \in \mathbf{G}(T)$ .

2. Найдем такую функцию  $U(\mathbf{x})$ , что  $\int_T U(\mathbf{x}) dx_1 \dots dx_n = 0$  и  $\nabla U = \mathbf{g}$ .

3. Положим  $\mathbf{f}_2(\mathbf{x})$  равной сумме  $\mathbf{F}(\mathbf{x})$  и векторного поля,  $k$ -я компонента которого равна  $\sum_{l=1}^n b_{l,k}(\mathbf{x}) \frac{\partial U(\mathbf{x})}{\partial x_l}$ .

Равенство нулю среднего значения на втором шаге достигается прибавлением подходящей константы.

Докажем сжимаемость  $B$  при условии (4). Рассмотрим произвольные векторные поля  $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$  и их образы  $B\mathbf{F}_1, B\mathbf{F}_2$  и установим неравенство

$$\|B\mathbf{F}_1 - B\mathbf{F}_2\| \leq \eta \|\mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2\|. \tag{7}$$

Для этого заметим, что переход от  $\mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2$  к  $B\mathbf{F}_1 - B\mathbf{F}_2$  осуществляет линейный оператор, равный  $B$  при  $\mathbf{F}(\mathbf{x}) \equiv 0$ . Сначала этот оператор ортогонально в  $L^2(T)$  проектирует векторное поле  $\mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2$  на  $\mathbf{G}(T)$ , не увеличивая при этом  $L^2(T)$ -норму, а затем поточечно умножает результат на матрицу  $b_{l,k}(\mathbf{x})$ . На последнем шаге  $L^2(T)$ -норма возрастает не более чем в  $\eta$  раз, поскольку умножение  $n$ -мерного вектора (градиента в точке  $\mathbf{x}$ ) на матрицу  $b_{l,k}(\mathbf{x})$  при условии (4) увеличивает его евклидову норму не более чем в  $\eta$  раз.

Введем последовательность векторных полей  $\{\mathbf{f}_k\}_{k=1}^\infty$  равенствами  $\mathbf{f}_0 \equiv 0, \mathbf{f}_{k+1} = B\mathbf{f}_k$ . Ясно, что  $\mathbf{f}_1 = B\mathbf{f}_0 = \mathbf{F}$ , и потому  $\mathbf{f}_1 - \mathbf{f}_0 = \mathbf{F}$ . Неравенство  $\|\mathbf{f}_{k+1} - \mathbf{f}_k\| \leq \eta \|\mathbf{f}_k - \mathbf{f}_{k-1}\|$ , верное в силу (7), по индукции влечет неравенство  $\|\mathbf{f}_{k+1} - \mathbf{f}_k\| \leq \eta^k \|\mathbf{f}_1 - \mathbf{f}_0\| = \eta^k \|\mathbf{F}\|$ . Оно вместе с условием  $0 \leq \eta < 1$  дает фундаментальность последовательности  $\{\mathbf{f}_k\}_{k=1}^\infty$  в  $L^2(T)$ , сходящейся в  $L^2(T)$  к некоторому  $\mathbf{f}_\infty$ , для которого верно неравенство

$$\|\mathbf{f}_\infty\| = \left\| \sum_{k=0}^\infty (\mathbf{f}_{k+1} - \mathbf{f}_k) \right\| \leq \sum_{k=0}^\infty \|(\mathbf{f}_{k+1} - \mathbf{f}_k)\| \leq \sum_{k=0}^\infty \eta^k \|\mathbf{F}\| = \|\mathbf{F}\|/(1 - \eta). \tag{8}$$

В силу непрерывности сжимающего отображения  $B$ , сходимости  $\{\mathbf{f}_k\}_{k=1}^\infty$  к  $\mathbf{f}_\infty$  и равенства  $\mathbf{f}_{k+1} = B\mathbf{f}_k$  неподвижная точка  $B$  равна  $\mathbf{f}_\infty$ . Первые два шага алгоритма, примененные к  $\mathbf{f}_\infty$ , дают решение  $U$ . Ортогональное проектирование  $\mathbf{f}_\infty$  на  $\mathbf{G}(T)$  на первом шаге дает  $\nabla U$ . Неравенства  $\|\nabla U\| \leq \|\mathbf{f}_\infty\|$  и (8) приводят к оценке (6) для  $\nabla U$ . Единственность решения следует из сжимаемости  $B$ . Теорема доказана.

**Теорема 2.** Пусть измеримая матричнозначная функция  $\{a_{l,k}(\mathbf{x})\}_{l,k=1}^n$  на торе  $T$  при каждом  $\mathbf{x} \in T$  эрмитова, действительна и удовлетворяет неравенству

$$m \leq \sum_{l,k=1}^n a_{l,k}(\mathbf{x}) \xi_l \xi_k / \sum_{k=1}^n \xi_k^2 \leq M \tag{9}$$

при всех  $\xi \in \mathbb{R}^n$  с положительными постоянными  $m$  и  $M$ , не зависящими от  $\mathbf{x}$  и  $\xi$ . Тогда для всякого комплексного векторного поля  $\mathbf{F} \in L^2(T)$  существует единственная функция  $U \in W_2^1(T)$ , удовлетворяющая условию  $\int_T U(\mathbf{x}) dx_1 \dots dx_n = 0$  и уравнению (1) в следующем смысле:  $\mathbf{J}(T)$  содержит разность векторного поля  $\mathbf{F}(\mathbf{x})$  и векторного поля,  $k$ -я компонента которого равна  $\sum_{l=1}^n a_{l,k}(\mathbf{x}) \frac{\partial U(\mathbf{x})}{\partial x_l}$ . Для  $U$  справедливо неравенство  $\|\nabla U\| \leq C(m, M) \|\mathbf{F}\|$  с константой  $C(m, M)$ , не зависящей от  $U$  и  $\mathbf{F}$ .

**Доказательство.** Не ограничивая общности, считаем, что  $M < 1$ . Это условие достигается (при необходимости) делением  $a_{l,k}(\mathbf{x})$  и  $\mathbf{F}(\mathbf{x})$  на  $2M$  и введением новых обозначений.

Положим  $b_{l,k}(\mathbf{x}) = \delta_{l,k} - a_{l,k}(\mathbf{x})$ , где  $\delta_{l,k} = 1$  при  $l = k$  и  $\delta_{l,k} = 0$  при  $l \neq k$ . Тогда уравнения (1) и (5) станут равносильны, а их разрешимость будет вытекать из теоремы 1, условие (4) которой проверяется следующим образом. Ввиду неравенств  $M < 1$  и (9) все собственные значения симметричной матрицы  $a_{l,k}(\mathbf{x})$  содержатся в отрезке  $[m, 1]$ . Стало быть, все собственные значения

симметричной матрицы  $b_{l,k}(\mathbf{x})$  заключены между нулем и  $1 - m$ ,  $0 < m < 1$ . Поэтому при каждом  $\mathbf{x}$  линейный оператор, определяемый матрицей  $b_{l,k}(\mathbf{x})$ , является сжатием евклидова пространства  $\mathbb{R}^n$  с коэффициентом, не превышающим  $1 - m$ ,  $0 < m < 1$ , что проверяется переходом к ортонормированному базису из собственных векторов. Условие (4), означающее сжатие, имеет место при некотором  $\eta \leq 1 - m$ . Оценка для  $\nabla U$  следует из теоремы 1. Теорема доказана.

**Теорема 3.** Пусть измеримые комплекснозначные функции  $d_k(\mathbf{x})$ ,  $k = 1, \dots, n$ , ограничены на торе, а их действительные части положительны и равномерно отделены от нуля:  $\sup_{x \in T, 1 \leq k \leq n} |d_k(\mathbf{x})| = M < +\infty$ ,  $\inf_{x \in T, 1 \leq k \leq n} \operatorname{Re}(d_k(\mathbf{x})) = m > 0$ . Тогда для всякого комплексного векторного поля  $\mathbf{F} \in L^2(T)$  существует единственная функция  $U \in W_2^1(T)$ , удовлетворяющая условию

$$\int_T U(\mathbf{x}) dx_1 \dots dx_n = 0$$

и уравнению

$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial x_k} \left( d_k(\mathbf{x}) \frac{\partial U(\mathbf{x})}{\partial x_k} \right) = \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \quad (10)$$

в том смысле, что  $\mathbf{J}(T)$  содержит векторное поле  $(d_1(\mathbf{x}) \frac{\partial U(\mathbf{x})}{\partial x_1}, \dots, d_n(\mathbf{x}) \frac{\partial U(\mathbf{x})}{\partial x_n}) - \mathbf{F}(\mathbf{x})$ . Для  $U$  справедливо неравенство  $\|\nabla U\| \leq C(m, M) \|\mathbf{F}\|$  с константой  $C(m, M)$ , не зависящей от  $U$  и  $\mathbf{F}$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Разделим (10) на подходящее число  $P$  так, чтобы стало возможным применение теоремы 1. При этом диагональная матрица с элементами  $b_{k,k}(\mathbf{x}) = 1 - d_k(\mathbf{x})/P$  на диагонали должна удовлетворять условию (4). Оно выполняется, когда

$$\sup_{x \in T, 1 \leq k \leq n} |1 - d_k(\mathbf{x})/P| = \eta < 1. \quad (11)$$

Докажем, что последнее условие верно при некоторых положительных  $P$  и  $\eta$ . Для этого построим на комплексной плоскости симметричный относительно действительной оси замкнутый прямоугольник, содержащий множество  $\{d_k(\mathbf{x})\}_{x \in T, 1 \leq k \leq n}$  и находящийся на расстоянии  $m > 0$  от мнимой оси. Длины сторон прямоугольника равны  $2M$  и  $M - m$ . Через вершины ближайшей к мнимой оси стороны проведем окружность, отстоящую от мнимой оси на расстояние  $q \in (0; m)$ . При  $q$ , достаточно близких к  $m$ , прямоугольник находится внутри окружности. Фиксируем такую окружность, действительную координату  $P > 0$  ее центра и число  $q$ . Ясно, что все точки множества  $\{d_k(\mathbf{x})\}_{x \in T, 1 \leq k \leq n}$  отстоят от действительной точки  $P > 0$  не более чем на  $P - q$ . Таким образом, условие (11) выполняется при некотором  $\eta \leq (P - q)/P$ . Поэтому разрешимо уравнение (10), так как по теореме 1 разрешимо уравнение (10), в котором вместо  $d_k(\mathbf{x})$  и  $\mathbf{F}(\mathbf{x})$  фигурируют  $d_k(\mathbf{x})/P$  и  $\mathbf{F}(\mathbf{x})/P$ . Оценка для  $\nabla U$  следует из теоремы 1, а также из того наблюдения, что  $P$  и  $q$  полностью определяются числами  $M$  и  $m$ . Теорема доказана.

Можно получить аналоги теорем 1–3 о разрешимости уравнения (1) на всем  $\mathbb{R}^n$ , заменив в них (а также в разложении Вейля) включение  $U \in W_2^1(T)$  на  $\nabla U \in L^2(\mathbb{R}^n)$ ,  $U \in L_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^n)$ .

Разрешимость уравнения (1) позволяет выявить наличие нетривиального решения стационарного уравнения Фоккера — Планка — Колмогорова (2) с комплексными коэффициентами.

**Теорема 4.** Пусть комплексное векторное поле  $\mathbf{f}$  на торе  $T$  ограничено и измеримо, а матричнозначная функция  $\{a_{l,k}(\mathbf{x})\}_{l,k=1}^n$  удовлетворяет по крайней мере одному из следующих трех условий:

- 1) условия теоремы 2;
- 2) она представима в виде  $a_{l,k}(\mathbf{x}) = \delta_{l,k} - b_{l,k}(\mathbf{x})$ , где  $\delta_{l,k} = 1$  при  $l = k$  и  $\delta_{l,k} = 0$  при  $l \neq k$ , а  $b_{l,k}(\mathbf{x})$  удовлетворяет условиям теоремы 1;
- 3)  $a_{l,k}(\mathbf{x}) = 0$  при  $l \neq k$ , а  $a_{k,k}(\mathbf{x}) = d_k(\mathbf{x})$  удовлетворяют условиям теоремы 3.

Тогда существует функция  $U \in W_2^1(T)$ , отличная от нуля на множестве положительной меры и удовлетворяющая уравнению (2) в следующем смысле:  $\mathbf{J}(T)$  содержит разность векторного поля  $U(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x})$  и векторного поля,  $k$ -я компонента которого равна  $\sum_{l=1}^n a_{l,k}(\mathbf{x}) \frac{\partial U(x)}{\partial x_l}$ .

Отметим, что ранее в [1–4] частный случай уравнения (2) — уравнение  $\Delta u - \operatorname{div}(u\mathbf{f}) = 0$  — исследовался с помощью разложения Вейля и решения уравнения  $\Delta U = \operatorname{div} \mathbf{F}$ . Приводимое ниже доказательство теоремы 4 опирается на разрешимость уравнения (1) вместо  $\Delta U = \operatorname{div} \mathbf{F}$ . Тем самым обобщаются рассуждения из [3, 4].

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.** Пусть выполняются условия теоремы 4 и  $r \in \mathbb{R}$ . Определим отображение  $A$  пространства  $L^2(T)$  векторных полей в себя, ставящее в соответствие всякому векторному полю  $\mathbf{f}_1$  векторное поле  $\mathbf{f}_2$  по следующему алгоритму.

1. Найдем такое обобщенное решение  $U \in W_2^1(T)$  уравнения

$$\sum_{l,k=1}^n \frac{\partial}{\partial x_k} \left( a_{l,k}(\mathbf{x}) \frac{\partial U(x)}{\partial x_l} \right) = \operatorname{div} \mathbf{f}_1(\mathbf{x}),$$

что  $\int_T U(\mathbf{x}) dx_1 \dots dx_n = r$ .

2. Положим  $\mathbf{f}_2(\mathbf{x}) = U(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x})$ .

Связь отображения  $A$  с уравнением (2) поясняет

**Лемма 1.** Пусть выполняются условия теоремы 4 и  $r \in \mathbb{R}$ , а отображение  $A$  имеет неподвижную точку. Тогда функция  $U \in W_2^1(T)$ , полученная из этой неподвижной точки с помощью первого шага алгоритма, удовлетворяет условию  $\int_T U(\mathbf{x}) dx_1 \dots dx_n = r$  и уравнению (2). Указанная неподвижная точка равна  $U(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x})$ .

Введем оператор  $S : L^2(T) \rightarrow L^2(T)$ , равный отображению  $A$  при  $r = 0$ . Оператор  $S$  линеен; без труда проверяются следующие равенства:  $A\mathbf{f}_1 - A\mathbf{f}_2 = S(\mathbf{f}_1 - \mathbf{f}_2)$ ,  $A\mathbf{a} = S\mathbf{a} + r\mathbf{f}$  при всех  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{a} \in L^2(T)$ .

**Лемма 2.** Пусть верны условия теоремы 4 и оператор  $I - S$  ( $I$  — тождественный оператор) имеет обратный, определенный на всем  $L^2(T)$ . Тогда существует указанное в лемме 1 обобщенное решение уравнения (2) при  $r = 1$ , а векторное поле  $U(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (I - S)^{-1}\mathbf{f}(\mathbf{x})$  является неподвижной точкой оператора  $A$  при  $r = 1$ .

Леммы 1 и 2 элементарны и, по существу, доказаны в [3]. Следующая лемма обобщает теорему 1 из [4].

**Лемма 3.** При условиях теоремы 4 оператор  $S : L^2(T) \rightarrow L^2(T)$  компактен.

Доказательство основывается на теореме Реллиха, согласно которой ограниченное в  $W_2^1(T)$  множество предкомпактно в  $L^2(T)$ . Первый шаг определения 1 при  $r = 0$  дает непрерывный линейный оператор из  $L^2(T)$  в  $W_2^1(T)$ . Это верно в силу оценки  $\|\nabla U\| \leq C\|\mathbf{F}\|$  из теорем 1–3 и леммы 1 из [1] (или леммы 3 из [4]). Компактность указанного оператора как отображения из  $L^2(T)$  в  $L^2(T)$  следует из теоремы Реллиха. Лемма доказана.

Доказательство теоремы 4. Если компактный оператор  $S : L^2(T) \rightarrow L^2(T)$  не имеет единичных собственных значений, то оператор  $I - S$  обратим по теореме о спектре компактного оператора и нетривиальная разрешимость следует из леммы 2.

Если оператор  $S$  имеет единичное собственное значение, то он, т. е. отображение  $A$  при  $r = 0$ , имеет отличную от тождественного нуля неподвижную точку. Поэтому на основании леммы 1 уравнение (2) имеет решение  $U(\mathbf{x})$ , которое отлично от тождественного нуля, так как в противном случае неподвижная точка  $U(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x})$  была бы тождественным нулем. Теорема доказана.

Следующее утверждение дает пример уравнения (2) с многомерным пространством решений.

**Теорема 5.** Рассмотрим последовательности векторных полей

$$\mathbf{f}_k(\mathbf{x}) = 2\pi k i \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}) = (1, 1, \dots, 1),$$

и функций  $u_k(y) = \exp(2\pi k i y)$ . Тогда при каждом целом  $k \neq 0$  уравнение  $\Delta u - \operatorname{div}(u\mathbf{f}_k) = 0$  имеет по крайней мере  $2^n$  линейно независимых решений на торе. Они представимы в виде  $u(\mathbf{x}) = \prod_{l=1}^n (a_l u_k(x_l) + b_l)$  с коэффициентами  $a_l, b_l$ , равными нулю или единице.

Доказательство. Разделением переменных задача сводится к одномерному уравнению  $u'' - 2\pi k i u' = 0$ , имеющему решения  $u(x) \equiv 1$  и  $u_k(x) = \exp(2\pi k i x)$ . Теорема доказана.

Следующая теорема суммирует полученные результаты и показывает, что неединственность решений уравнения (2) представляет собой исключительное явление.

**Теорема 6.** Пусть выполнены условия теоремы 4. Обозначим через  $\Gamma$  множество всех тех отличных от нуля комплексных  $\gamma$ , для которых  $1/\gamma$  принадлежит спектру оператора  $S$ . Тогда

1) множество  $\Gamma$  не имеет предельных точек, замкнуто, не более чем счетно и не содержит нуля;

2) при любом комплексном  $\gamma \notin \Gamma$  уравнение

$$\sum_{l,k=1}^n \frac{\partial}{\partial x_k} \left( a_{l,k}(\mathbf{x}) \frac{\partial U(x)}{\partial x_l} \right) - \operatorname{div}(U(\mathbf{x})\gamma\mathbf{f}(\mathbf{x})) = 0 \quad (12)$$

имеет обобщенное решение  $U \in W_2^1(T)$ , для которого  $\int_T U(\mathbf{x}) dx_1 \dots dx_n = 1$ ;

3) при непустом  $\Gamma$  и  $\gamma \in \Gamma$  уравнение (12) имеет обобщенное решение  $U \in W_2^1(T)$ , отличное от нуля на множестве положительной меры и такое, что  $\int_T U(\mathbf{x}) dx_1 \dots dx_n = 0$ ;

4) при любом комплексном  $\gamma \notin \Gamma$  любые два решения уравнения (12) линейно зависимы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждения 2 и 3 содержатся в леммах 1, 2 и в доказательстве теоремы 4. Проверка свойств 1 и 4 аналогична доказательству теоремы 4 из [4]. Теорема доказана.

Как показывает теорема 5, при  $\gamma \in \Gamma$  пространство решений может быть многомерным (но конечной размерности — в силу компактности  $S$ ), а само множество  $\Gamma$  может быть счетным. Умножая векторное поле из теоремы 5, а вместе с ним и оператор  $S$  на подходящие комплексные числа, можно получить оператор как с единичным собственным значением, так и без него. Тем самым можно проиллюстрировать оба случая, рассмотренных в доказательстве теоремы 4.

Обращаясь к нетривиальной разрешимости уравнения (2) и вообще уравнений вида (3), приведем пример недивергентного уравнения  $\Delta u(\mathbf{x}) + V(\mathbf{x})u(\mathbf{x}) = 0$ . Как показано в [4], оно не имеет нетривиальных решений на торе для типичной функции  $V$ .

В заключение отметим, что наибольший интерес представляет доказанная в работе разрешимость уравнений (1), (2) и (12) с комплексными коэффициентами. При действительных коэффициентах и векторном поле разрешимость (2) на торе, по-видимому, известна специалистам по диффузионным процессам (см. [6, с. 276; 7]). Известны также положительность решения и одномерность пространства решений уравнений (2) и (12) с действительными  $\gamma$ . При этом действительность  $\gamma$  существенна, как показывает пример векторного поля  $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (1, 1, \dots, 1)$  из теоремы 5. Для частного случая уравнения (12) — уравнения  $\Delta u - \operatorname{div}(u\gamma\mathbf{f}) = 0$  — на всем  $\mathbb{R}^n$  положительность и единственность решения при действительных  $\gamma$  доказаны в [3]. Там же доказано отсутствие положительных точек в  $\Gamma$ , хотя определения множества  $\Gamma$  и оператора  $S$ , приведенные в [3] и в данной работе, несколько различаются.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Ноаров А. И. О разрешимости стационарных уравнений Фоккера — Планка, близких к уравнению Лапласа // Дифференц. уравнения. 2006. Т. 42, № 4. С. 521–530.
2. Ноаров А. И. Обобщенная разрешимость стационарного уравнения Фоккера — Планка // Дифференц. уравнения. 2007. Т. 43, № 6. С. 813–819.
3. Ноаров А. И. Однозначная разрешимость стационарного уравнения Фоккера — Планка в классе положительных функций // Дифференц. уравнения. 2009. Т. 45, № 2. С. 191–202.
4. Ноаров А. И. Существование и неединственность решений одного функционально-дифференциального уравнения // Сиб. мат. журн. 2012. Т. 53, № 6. С. 1385–1390.
5. Ладыженская О. А. Математические вопросы динамики вязкой несжимаемой жидкости. М.: Наука, 1961.
6. Ватанабе С., Икеда Н. Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы. М.: Мир, 1986.
7. Zeeman E. C. Stability of dynamical systems // Nonlinearity. 1988. V. 1. P. 115–155.

Статья поступила 25 июня 2013 г.

Ноаров Александр Игоревич  
Институт вычислительной математики РАН,  
ул. Губкина, 8, Москва 119333  
ligrans@mail.ru