

СОВМЕСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ L -ФУНКЦИЙ ДИРИХЛЕ И ДЗЕТА-ФУНКЦИЙ ЛЕРХА

А. Лауринчикас, Р. Мацайтене

Аннотация. Получена совместная теорема универсальности типа Воронина о приближении аналитических функций сдвигами L -функций Дирихле и дзета-функций Лерха.

Ключевые слова: дзета-функция Лерха, L -функция Дирихле, предельная теорема, пространство аналитических функций, мера Хаара, универсальность.

1. Введение

Пусть $s = \sigma + it$ — комплексная переменная, а χ — характер Дирихле по модулю q . L -функция Дирихле $L(s, \chi)$ при $\sigma > 1$ определяется рядом Дирихле

$$L(s, \chi) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\chi(m)}{m^s}$$

и в случае неглавного характера χ аналитически продолжается на всю комплексную плоскость. Если χ_0 — главный характер по модулю q ($\chi_0(m) = 1$ для всех $m \in \mathbb{N}$, $(m, q) = 1$, и $\chi_0(m) = 0$ для $(m, q) > 1$), то

$$L(s, \chi_0) = \zeta(s) \prod_{p|q} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right),$$

где $\zeta(s)$ — дзета-функция Римана, а p обозначает простое число. Следовательно, $L(s, \chi_0)$ в точке $s = 1$ имеет простой полюс с вычетом

$$\prod_{p|q} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Функции $L(s, \chi)$ введены Дирихле в 1837 г. как аналитический инструмент для изучения распределения простых чисел в арифметических прогрессиях. Аналитическая теория L -функций Дирихле изложена в [1–5].

Определим другой объект изучения в нашей статье. Пусть $\lambda \in \mathbb{R}$ и α , $0 < \alpha \leq 1$, — фиксированные параметры. Функция Лерха $L(\lambda, \alpha, s)$ определена Липшицем в 1857 г. [6], однако она названа именем Лерха, который в 1887 г. доказал [7] функциональное уравнение. В полуплоскости $\sigma > 1$ функция $L(\lambda, \alpha, s)$ определяется рядом Дирихле

$$L(\lambda, \alpha, s) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{e^{2\pi i \lambda m}}{(m + \alpha)^s}.$$

Работа выполнена при финансовой поддержке the European Community's Seventh Framework Programme FP7/2007–2013 (agreement N 230376).

Ввиду периодичности коэффициентов $e^{2\pi i\lambda m}$ можно считать, что $0 < \lambda \leq 1$. Если $\lambda \neq 1$, то $L(\lambda, \alpha, s)$ аналитически продолжается до целой функции. Если $\lambda = 1$, то она становится дзета-функцией Гурвица $\zeta(s, \alpha)$, которая имеет единственный простой полюс в точке $s = 1$ с вычетом 1. При $\lambda = 1$ и $\alpha = 1$ получаем классическую дзета-функцию Римана, а при $\lambda \neq 1$ и $\alpha = 1$ функция $L(\lambda, \alpha, s)$ превращается в периодическую функцию

$$\zeta_\lambda(s) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i\lambda m}}{m^s}, \quad \sigma > 1,$$

умноженную на $e^{-2\pi i\lambda}$. Дзета-функция Лерха не имеет прямого применения, скажем, при исследовании распределения простых чисел, однако зависимость от двух параметров делает ее интересным объектом с точки зрения арифметики, алгебры и комплексного анализа, она появляется в ряде задач аналитической теории чисел. Особенно возросло внимание к функции $L(\lambda, \alpha, s)$ в последние годы (см. [8, 9]). Аналитическая теория дзета-функции Лерха изложена в [10].

Интуитивно универсальность в математике понимается так же, как и на практике. *Универсальным* называется объект, имеющий влияние на широкий класс других объектов. В анализе универсальность обычно связана с приближением некоторым образом множества функций. Первый результат в этом направлении принадлежит Фекете (см. [11]), доказавшему существование действительного степенного ряда

$$\sum_{m=1}^{\infty} a_m x^m, \quad x \in [-1, 1],$$

который не только расходится для всех $x \neq 0$, но делает это наихудшим образом: для всякой непрерывной на $[-1, 1]$ функции $f(x)$, $f(0) = 0$, существует такая возрастающая последовательность целых положительных чисел n_k , что равномерно относительно $x \in [-1, 1]$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{m \leq n_k} a_m x^m = f(x).$$

Эта теорема неэффективна, ряд (1) не имеет явного вида, доказано только его существование. Позже и другие авторы нашли некоторым образом универсальные аналитические объекты, однако все они оказались также неэффективными (см. статью [12], в которой дано такое общее определение универсального объекта). Пусть X и Y — два (в общем случае топологические) пространства, а $T_j : X \rightarrow Y$, $j \in I$, — непрерывные отображения. Тогда элемент $x \in X$ называется *универсальным относительно семейства* $\{T_j : j \in I\}$, если множество $\{T_j x : j \in I\}$ всюду плотно в Y .

Только в 1975 г. С. М. Воронин нашел явным образом заданный универсальный объект, и им оказалась знаменитая дзета-функция Римана $\zeta(s)$. С. М. Воронин доказал [13] следующую теорему, содержащую свойство универсальности функции $\zeta(s)$. Сущность этой универсальности — приближения аналитических функций сдвигами $\zeta(s + i\tau)$, $\tau \in \mathbb{R}$. Пусть $0 < r < \frac{1}{4}$, а функция $f(s)$ непрерывна, не имеет нулей в круге $|s| \leq r$ и аналитична внутри этого круга. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ существует такое число $\tau = \tau(\varepsilon) \in \mathbb{R}$, что выполняется неравенство

$$\max_{|s| \leq r} \left| \zeta\left(s + \frac{3}{4} + i\tau\right) - f(s) \right| < \varepsilon.$$

Теорема Воронина имеет более общий вид (см., например, [14]). Через $\text{mes}\{A\}$ будем обозначать меру Лебега измеримого множества $A \subset \mathbb{R}$. Пусть K — компактное подмножество полосы $D = \{s \in \mathbb{C} : \frac{1}{2} < \sigma < 1\}$, обладающее связным дополнением, а функция $f(s)$ непрерывна, не имеет нулей на K и аналитична внутри K . Тогда для всякого $\varepsilon > 0$

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : \sup_{s \in K} |\zeta(s + i\tau) - f(s)| < \varepsilon\} > 0.$$

Последнее неравенство показывает, что существует бесконечно много таких действительных чисел τ , что сдвиг $\zeta(s + i\tau)$ с желаемой точностью равномерно на K приближает заданную аналитическую функцию.

Пусть G — область на комплексной плоскости, а $H(G)$ — пространство аналитических функций на G , снабженное топологией равномерной сходимости на компактах. Тогда в определении универсальности можем брать $X = Y = H(D)$, а $T_\tau : g(s) \rightarrow g(s + i\tau)$, $g \in H(D)$. Множество $\{T_\tau : \tau \in \mathbb{R}\}$ плотно в множестве $\{g \in H(D) : g(s) \neq 0\}$.

Аналогичная теорема универсальности, как замечено в [13], также имеет место для всякой L -функции Дирихле $L(s, \chi)$. Однако в случае L -функций Дирихле более важной и интересной является совместная теорема универсальности, когда несколько заданных аналитических функций приближаются сдвигами $L(s + i\tau, \chi_j)$. Ясно, что в этом случае сдвиги $L(s + i\tau, \chi_j)$ должны быть некоторым образом независимыми и эта независимость может быть обеспечена попарной неэквивалентностью характеров χ_j . Мы приводим современный вариант совместной теоремы универсальности Воронина [15] для функций $L(s, \chi_j)$, доказательство которого содержится в [16]. Предположим, что χ_1, \dots, χ_r — попарно не эквивалентные характеры Дирихле. При $j = 1, \dots, r$ пусть K_j — компактное подмножество полосы D , обладающее связным дополнением, а $f_j(s)$ — непрерывная, не имеющая нулей на K_j и аналитическая внутри K_j функция. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : \sup_{1 \leq j \leq r} \sup_{s \in K_j} |L(s + i\tau, \chi_j) - f_j(s)| < \varepsilon\} > 0.$$

Другие версии совместной теоремы универсальности для L -функций Дирихле получены также в [17–19].

Свойства дзета-функции Лерха $L(\lambda, \alpha, s)$ во многом зависят от параметров λ и α . В частности, ее универсальность тесно связана с множеством

$$L(\alpha) = \{\log(m + \alpha) : m \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}\}.$$

Если множество $L(\alpha)$ линейно независимо над полем рациональных чисел \mathbb{Q} , то нетрудно получить универсальность $L(\lambda, \alpha, s)$. Легко видеть, что множество $L(\alpha)$ линейно независимо над \mathbb{Q} , если α — трансцендентное число. В этом случае имеет место такое утверждение. Пусть K — компактное подмножество полосы D , обладающее связным дополнением, а $f(s)$ — непрерывная на K и аналитическая внутри K функция. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : \sup_{s \in K} |L(\lambda, \alpha, s + i\tau) - f(s)| < \varepsilon\} > 0.$$

Отметим, что в этой теореме в отличие от случая функции $\zeta(s)$ приближаемая функция $f(s)$ может иметь нули, лежащие в K . В случае рационального

α функция $L(\lambda, \alpha, s)$ также универсальна при рациональном λ [10]. Случай алгебраического иррационального параметра α остается открытым до сих пор.

Совместная универсальность дзета-функций Лерха $L(\lambda_j, \alpha_j, s)$ с алгебраически независимыми параметрами $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ рассматривалась в [20–23]. Аналогично [24] можно получить следующий результат. Пусть

$$L(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = \{\log(m + \alpha_j) : m \in \mathbb{N}_0, j = 1, \dots, r\}.$$

Предположим, что множество $L(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ линейно независимо над \mathbb{Q} . При $j = 1, \dots, r$ пусть K_j — компактное подмножество полосы D , обладающее связным дополнением, а $f_j(s)$ — непрерывная на K_j и аналитическая внутри K_j функция. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : \sup_{1 \leq j \leq r} \sup_{s \in K_j} |L(\lambda_j, \alpha_j, s + i\tau) - f_j(s)| < \varepsilon\} > 0.$$

Отметим, что это верно для всех $0 < \lambda_j \leq 1, j = 1, \dots, r$. В случае рациональных λ_j можно рассматривать более общую схему, когда каждому параметру α_j соответствует набор $\lambda_{j1}, \dots, \lambda_{jl_j}, l_j \in \mathbb{N}$, и при некотором дополнительном ранговом условии получить универсальность функций $(L(\lambda_{11}, \alpha_1, s), \dots, L(\lambda_{1l_1}, \alpha_1, s), \dots, L(\lambda_{r1}, \alpha_r, s), \dots, L(\lambda_{rl_r}, \alpha_r, s))$. Это сделано в [21, 22].

Цель настоящей статьи — получить совместную теорему универсальности для набора функций, состоящего из L -функций Дирихле и дзета-функций Лерха. Через \mathcal{P} обозначим множество всех простых чисел и определим множество

$$L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r) = \{(\log p : p \in \mathcal{P}), (\log(m + \alpha_j) : m \in \mathbb{N}_0, j = 1, \dots, r)\}.$$

Теорема 1. *Предположим, что χ_1, \dots, χ_l — попарно не эквивалентные характеры Дирихле, а множество $L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ линейно независимо над \mathbb{Q} . При $j = 1, \dots, l$ пусть K_j — компактное подмножество полосы D , обладающее связным дополнением, а функция $f_j(s)$ непрерывна и не имеет нулей на K_j и аналитична внутри K_j . При $j = 1, \dots, r$ пусть \widehat{K}_j — компактное подмножество полосы D , обладающее связным дополнением, а функция $\widehat{f}_j(s)$ непрерывна на \widehat{K}_j и аналитична внутри \widehat{K}_j . Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ и любых $\lambda_j \in (0, 1), j = 1, \dots, r$,*

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : \sup_{1 \leq j \leq l} \sup_{s \in K_j} |L(s + i\tau, \chi_j) - f_j(s)| < \varepsilon, \sup_{1 \leq j \leq r} \sup_{s \in \widehat{K}_j} |L(\lambda_j, \alpha_j, s + i\tau) - \widehat{f}_j(s)| < \varepsilon\} > 0.$$

Следствие 2. *Предположим, что условие теоремы 1 линейной независимости множества $L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ над \mathbb{Q} заменено условием алгебраической независимости чисел $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ над \mathbb{Q} . Тогда имеет место утверждение теоремы 1.*

Доказательство теоремы 1 проведем с использованием предельных теорем о слабой сходимости вероятностных мер в функциональных пространствах.

2. Предельные теоремы

Через $\mathcal{B}(X)$ будем обозначать борелевское σ -поле пространства X . Пусть $H(D)$ — пространство аналитических на D функций, снабженное топологией равномерной сходимости на компактах. Для краткости положим

$$\underline{L}(s, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) = (L(s, \chi_1), \dots, L(s, \chi_l), L(\lambda_1, \alpha_1, s), \dots, L(\lambda_r, \alpha_r, s)),$$

где $\underline{\chi} = (\chi_1, \dots, \chi_l)$, $\underline{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ и $\underline{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_r)$. В настоящем разделе докажем предельную теорему в пространстве $H^{l+r}(D)$ для вектора $\underline{L}(s, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})$, для формулирования которой нужны некоторые обозначения и определения.

Пусть $\gamma = \{s \in \mathbb{C} : |s| = 1\}$ — единичная окружность на комплексной плоскости. Определим два тора

$$\Omega = \prod_{p \in \mathcal{P}} \gamma_p \quad \text{и} \quad \widehat{\Omega} = \prod_{m=0}^{\infty} \gamma_m,$$

где $\gamma_p = \gamma$ для всех $p \in \mathcal{P}$ и $\gamma_m = \gamma$ для всех $m \in \mathbb{N}_0$. На Ω и $\widehat{\Omega}$ можем определить операцию поточечного перемножения и топологию произведения. Тогда по теореме Тихонова они становятся компактными топологическими абелевыми группами. Следовательно, на $(\Omega, \mathcal{B}(\Omega))$ и $(\widehat{\Omega}, \mathcal{B}(\widehat{\Omega}))$ существуют вероятностные меры Хаара \underline{m}_H и \widehat{m}_H соответственно. Пусть

$$\underline{\Omega} = \Omega \times \prod_{j=1}^r \widehat{\Omega}_j,$$

где $\widehat{\Omega}_j = \widehat{\Omega}$ при $j = 1, \dots, r$. Тогда $\underline{\Omega}$ также является компактной топологической группой, что приводит к вероятностному пространству $(\underline{\Omega}, \mathcal{B}(\underline{\Omega}), \underline{m}_H)$ с вероятностной мерой Хаара \underline{m}_H на $(\underline{\Omega}, \mathcal{B}(\underline{\Omega}))$. Через $\underline{\omega} = (\omega, \widehat{\omega}_1, \dots, \widehat{\omega}_r)$ будем обозначать элементы группы $\underline{\Omega}$, где $\omega \in \Omega$, а $\widehat{\omega}_j \in \widehat{\Omega}_j$, $j = 1, \dots, r$. Пусть $\omega(p)$ — проекция элемента $\omega \in \Omega$ на координатное пространство γ_p , $p \in \mathcal{P}$, а $\widehat{\omega}_j(m)$ — проекция элемента $\widehat{\omega}_j \in \widehat{\Omega}_j$, $j = 1, \dots, r$, на координатное пространство γ_m , $m \in \mathbb{N}_0$. На вероятностном пространстве $(\underline{\Omega}, \mathcal{B}(\underline{\Omega}), \underline{m}_H)$ определим $H^{l+r}(D)$ -значный случайный элемент $\underline{L}(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})$ формулой

$$\underline{L}(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) = (L(s, \omega, \chi_1), \dots, L(s, \omega, \chi_l), L(\lambda_1, \alpha_1, s, \omega_1), \dots, L(\lambda_r, \alpha_r, s, \omega_r)),$$

где

$$L(s, \omega, \chi_j) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(1 - \frac{\chi_j(p)\omega(p)}{p^s} \right)^{-1}, \quad j = 1, \dots, l,$$

$$L(\lambda_j, \alpha_j, s, \omega_j) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{e^{2\pi i m \lambda_j} \omega_j(m)}{(m + \alpha_j)^s}, \quad j = 1, \dots, r.$$

Пусть $P_{\underline{L}}$ — распределение случайного элемента $\underline{L}(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})$, т. е.

$$P_{\underline{L}}(A) = \underline{m}_H(\underline{\omega} \in \underline{\Omega} : \underline{L}(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \in A), \quad A \in \mathcal{B}(H^{l+r}(D)).$$

Теперь формулируем основной результат этого раздела.

Теорема 3. *Предположим, что множество $L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ линейно независимо над \mathbb{Q} . Тогда*

$$P_T(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : \underline{L}(s + i\tau, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \in A\}, \quad A \in \mathcal{B}(H^{l+r}(D)),$$

при $T \rightarrow \infty$ слабо сходится к $P_{\underline{L}}$.

Доказательство теоремы 3 разобьем на несколько лемм. Начнем с предельной теоремы на $\underline{\Omega}$.

Лемма 4. Предположим, что множество $L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ линейно независимо над \mathbb{Q} . Тогда

$$Q_T(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : ((p^{-i\tau} : p \in \mathcal{P}), ((m + \alpha_1)^{-i\tau} : m \in \mathbb{N}_0), \dots, ((m + \alpha_r)^{-i\tau} : m \in \mathbb{N}_0)) \in A\}, \quad A \in \mathcal{B}(\Omega),$$

при $T \rightarrow \infty$ слабо сходится к \underline{m}_H .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ 4. Как это обычно делается в случае вероятностных мер на группах, применим метод преобразований Фурье. Преобразование Фурье $g_T(\underline{k})$, $\underline{k} = (k_p : p \in \mathcal{P}; k_{m_j} : m \in \mathbb{N}, j = 1, \dots, r)$, меры Q_T имеет вид

$$g_T(\underline{k}) = \frac{1}{T} \int_0^T \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{-i\tau k_p} \prod_{j=1}^r \prod_{m=0}^{\infty} (m + \alpha_j)^{-i\tau k_{m_j}} d\tau,$$

где только конечное число целых чисел k_p и k_{m_j} отличны от нуля. Отсюда находим, что

$$g_T(\underline{k}) = \frac{1}{T} \int_0^T \exp \left\{ -i\tau \sum_{p \in \mathcal{P}} k_p \log p + i\tau \sum_{j=1}^r \sum_{m=0}^{\infty} k_{m_j} \log(m + \alpha_j) \right\} d\tau.$$

Учитывая линейную независимость множества $L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$, отсюда находим, что

$$\lim_{T \rightarrow \infty} g_T(\underline{k}) = \begin{cases} 1, & \text{если } \underline{k} = \underline{0}, \\ 0, & \text{если } \underline{k} \neq \underline{0}. \end{cases}$$

Полученное равенство и известные теоремы непрерывности на компактных группах (см., например, [25]), дают утверждение леммы.

Пусть $\sigma_0 > \frac{1}{2}$ — фиксированное число и при $n \in \mathbb{N}$

$$u_n(m) = \exp \left\{ - \left(\frac{m}{n} \right)^{\sigma_0} \right\}, \quad u_n(m, \alpha) = \exp \left\{ - \left(\frac{m + \alpha}{n + \alpha} \right)^{\sigma_0} \right\}.$$

Определим функции

$$\begin{aligned} L_n(s, \chi_j) &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\chi_j(m) u_n(m)}{m^s}, \quad j = 1, \dots, l, \\ L_n(\lambda_j, \alpha_j, s) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{e^{2\pi i m \lambda_j} u_n(m, \alpha_j)}{(m + \alpha_j)^s}, \quad j = 1, \dots, r, \end{aligned} \tag{1}$$

и для $\underline{\omega} \in \underline{\Omega}$

$$\begin{aligned} L_n(s, \omega, \chi_j) &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\chi_j(m) \omega(m) u_n(m)}{m^s}, \quad j = 1, \dots, l, \\ L_n(\lambda_j, \alpha_j, s, \omega_j) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{e^{2\pi i m \lambda_j} \omega_j(m) u_n(m, \alpha_j)}{(m + \alpha_j)^s}, \quad j = 1, \dots, r. \end{aligned} \tag{2}$$

Тогда известным путем с использованием формулы Меллина получаем (см. [10, 14]), что все выше определенные ряды абсолютно сходятся при $\sigma > \frac{1}{2}$. Положим

$$\underline{L}_n(s, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) = (L_n(s, \chi_1), \dots, L_n(s, \chi_l), L_n(\lambda_1, \alpha_1, s), \dots, L_n(\lambda_r, \alpha_r, s)),$$

$$\begin{aligned} & \underline{L}_n(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \\ &= (L_n(s, \omega, \chi_1), \dots, L_n(s, \omega, \chi_l), L_n(\lambda_1, \alpha_1, \omega_1, s), \dots, L_n(\lambda_r, \alpha_r, \omega_r, s)). \end{aligned}$$

Для $A \in \mathcal{B}(H^{l+r}(D))$ определим

$$P_{T,n}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : \underline{L}_n(s + i\tau, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \in A\}$$

и для фиксированного $\widehat{\omega} \in \Omega$

$$P_{T,n,\widehat{\omega}}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : L_n(s + i\tau, \widehat{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \in A\}.$$

Лемма 5. Предположим, что множество $L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ линейно независимо над \mathbb{Q} . Тогда на $(H^{l+r}(D), \mathcal{B}(H^{l+r}(D)))$ существует вероятностная мера P_n такая, что $P_{T,n}$ и $P_{T,n,\widehat{\omega}}$ при $T \rightarrow \infty$ слабо сходятся к P_n .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Определим функции h_n и $\hat{h}_n : \underline{\Omega} \rightarrow H^{l+r}(D)$ соответственно формулами

$$h_n(\underline{\omega}) = \underline{L}_n(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})$$

и

$$\hat{h}_n(\underline{\omega}) = \underline{L}_n(s, \underline{\omega}, \widehat{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}).$$

Полагая

$$\underline{a}_\tau = ((p^{-i\tau} : p \in \mathcal{P}), ((m + \alpha_1)^{-i\tau} : m \in \mathbb{N}_0), \dots, ((m + \alpha_r)^{-i\tau} : m \in \mathbb{N}_0)),$$

имеем, что $h_n(\underline{a}_\tau) = \underline{L}_n(s + i\tau, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})$ и $\hat{h}_n(\underline{a}_\tau) = \underline{L}_n(s + i\tau, \widehat{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})$, поэтому $P_{T,n} = Q_T h_n^{-1}$ и $P_{T,n,\widehat{\omega}} = Q_T \hat{h}_n^{-1}$, где для измеримой функции $h : \underline{\Omega} \rightarrow H^{l+r}(D)$ мера $Q_T h^{-1}$ определяется равенством $Q_T h^{-1}(A) = Q_T(h^{-1}A)$, $A \in \mathcal{B}(H^{l+r}(D))$. Абсолютная сходимость рядов (1) и (2) влечет за собой непрерывность функций h_n и \hat{h}_n . Отсюда, из леммы 4 и теоремы 5.1 в [26] вытекает, что $P_{T,n}$ и $P_{T,n,\widehat{\omega}}$ при $T \rightarrow \infty$ слабо сходятся к $\underline{m}_H h_n^{-1}$ и $\underline{m}_H \hat{h}_n^{-1}$ соответственно. Поскольку мера Хаара \underline{m}_H инвариантна относительно сдвигов точками из $\underline{\Omega}$, получаем, что $\underline{m}_H h_n^{-1} = \underline{m}_H \hat{h}_n^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} P_n$.

Займемся приближением в среднем функций $\underline{L}(s, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})$ и $\underline{L}(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})$ соответственно функциями $\underline{L}_n(s, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})$ и $\underline{L}_n(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})$. Для этой цели нам нужна метрика пространства $H^{l+r}(D)$, индуцирующая его топологию равномерной сходимости на компактах. Известно, что существует последовательность $\{K_m : m \in \mathbb{N}\}$ компактных подмножеств полосы D такая, что

$$D = \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m,$$

$K_m \subset K_{m+1}$ для всех $m \in \mathbb{N}$, и если K — компактное подмножество полосы D , то $K \subset K_m$ при некотором m . Определим

$$\varrho(g_1, g_2) = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} \frac{\sup_{s \in K_m} |g_1(s) - g_2(s)|}{1 + \sup_{s \in K_m} |g_1(s) - g_2(s)|}, \quad g_1, g_2 \in H^{l+r}(D).$$

Тогда ϱ — метрика пространства $H^{l+r}(D)$, индуцирующая его топологию. Полагая для $\underline{g}_1 = (g_{11}, \dots, g_{1,l+r})$, $\underline{g}_2 = (g_{21}, \dots, g_{2,l+r}) \in H^{l+r}(D)$

$$\underline{\varrho}(\underline{g}_1, \underline{g}_2) = \max_{1 \leq j \leq l+r} \varrho(g_{1j}, g_{2j}),$$

получаем искомую метрику в пространстве $H^{l+r}(D)$.

Лемма 6. *Имеет место равенство*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \varrho(\underline{L}(s + i\tau, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}), L_n(s + i\tau, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})) d\tau = 0.$$

Предположим, что множество $L(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ линейно независимо над \mathbb{Q} . Тогда для почти всех $\underline{\omega} \in \underline{\Omega}$ справедливо равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \varrho(\underline{L}(s + i\tau, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}), L_n(s + i\tau, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})) d\tau = 0.$$

Доказательство. В [27] получено, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \varrho(L(s + i\tau, \chi_j), L_n(s + i\tau, \chi_j)) d\tau = 0, \quad j = 1, \dots, l, \quad (3)$$

и для почти всех $\omega \in \Omega$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \varrho(L(s + i\tau, \omega, \chi_j), L_n(s + i\tau, \omega, \chi_j)) d\tau = 0, \quad j = 1, \dots, l. \quad (4)$$

Аналогично в [10] доказано, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \varrho(L(\lambda_j, \alpha_j, s + i\tau), L_n(\lambda_j, \alpha_j, s + i\tau)) d\tau = 0, \quad j = 1, \dots, r, \quad (5)$$

и для почти всех $\widehat{\omega}_j \in \widehat{\Omega}_j$ при трансцендентном α_j , $j = 1, \dots, r$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \varrho(L(\lambda_j, \alpha_j, s + i\tau, \widehat{\omega}_j), L_n(\lambda_j, \alpha_j, s + i\tau, \widehat{\omega}_j)) d\tau = 0. \quad (6)$$

При этом трансцендентность чисел α_j используется только для линейной независимости над \mathbb{Q} множества $L(\alpha_j)$. Очевидно, что из линейной независимости множества $L(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ вытекает линейная независимость множеств $L(\alpha_1), \dots, L(\alpha_r)$. Таким образом, в условиях леммы равенства (6) имеют место.

Первое утверждение леммы является следствием равенств (3) и (5) и определения метрики ϱ . Второе утверждение леммы аналогично вытекает из равенств (4) и (6) и замечания, что мера Хаара \underline{m}_H является произведением мер Хаара m_H и \widehat{m}_{jH} , где \widehat{m}_{jH} — мера Хаара на $(\widehat{\Omega}_j, \mathcal{B}(\widehat{\Omega}_j))$, $j = 1, \dots, r$.

Для $A \in \mathcal{B}(H^{l+r}(D))$ и $\underline{\omega} \in \underline{\Omega}$ определим

$$P_{T, \underline{\omega}}(A) = \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : \underline{L}(s + i\tau, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \in A\}.$$

Опираясь на леммы 5 и 6, получим слабую сходимость при $T \rightarrow \infty$ для P_T и $P_{T, \underline{\omega}}$. При этом нам будет удобнее пользоваться сходимостью по распределению случайных элементов, которую будем обозначать через $\xrightarrow{\varrho}$.

Лемма 7. Предположим, что множество $L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ линейно независимо над \mathbb{Q} . Тогда на $(H^{l+r}(D), \mathcal{B}(H^{l+r}(D)))$ существует мера P такая, что P_T и $P_{T,\omega}$ при $T \rightarrow \infty$ слабо сходятся к P .

Доказательство. Пусть θ — случайная величина, определенная на некотором вероятностном пространстве $(\Omega_0, \mathcal{B}(\Omega_0), \mathbb{P})$ и равномерно распределенная на интервале $[0, 1]$. На этом вероятностном пространстве определим $H^{l+r}(D)$ -значный случайный элемент $\underline{X}_{T,n}$ формулой

$$\underline{X}_{T,n}(s) = (X_{T,n,1}(s), \dots, X_{T,n,l}(s), \widehat{X}_{T,n,1}(s), \dots, \widehat{X}_{T,n,r}(s)) = \underline{L}_n(s + i\theta T, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}).$$

Тогда в силу леммы 5 имеем, что

$$\underline{X}_{T,n}(s) \xrightarrow[T \rightarrow \infty]{\mathcal{D}} \underline{X}_n(s), \quad (7)$$

где

$$\underline{X}_n(s) = (X_{n,1}(s), \dots, X_{n,l}(s), \widehat{X}_{n,1}(s), \dots, \widehat{X}_{n,r}(s))$$

— $H^{l+r}(D)$ -значный случайный элемент, имеющий распределение P_n (напомним, что P_n — предельная мера в лемме 5). Так как ряды, определяющие функции $L_n(s, \chi_j)$, $j = 1, \dots, l$, и $L_n(\lambda_j, \alpha_j, s)$, $j = 1, \dots, r$, абсолютно сходятся при $\alpha > \frac{1}{2}$, то при $\sigma > \frac{1}{2}$ для всех $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T |L_n(\sigma + it, \chi_j)|^2 dt \\ = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{|\chi_j(m)|^2 u_n^2(m)}{m^{2\sigma}} \leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^{2\sigma}} < \infty, \quad j = 1, \dots, l, \quad (8) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T |L_n(\lambda_j, \alpha_j, \sigma + it)|^2 dt \\ = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{u_n^2(m, \alpha_j)}{(m + \alpha_j)^{2\sigma}} \leq \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(m + \alpha_j)^{2\sigma}} < \infty, \quad j = 1, \dots, r. \quad (9) \end{aligned}$$

Непосредственное применение интегральной формулы Коши и (8), (9) показывает, что существуют такие C_m, \widehat{C}_m и $\sigma_m > \frac{1}{2}, \widehat{\sigma}_m > \frac{1}{2}$, что для всех $n \in \mathbb{N}$

$$\limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \sup_{s \in K_m} |L_n(s + i\tau, \chi_j)| d\tau \leq C_m \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^{2\sigma_m}} \right)^{1/2}, \quad j = 1, \dots, l, \quad (10)$$

и

$$\limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \sup_{s \in K_m} |L_n(\lambda_j, \alpha_j, s + i\tau)| d\tau \leq \widehat{C}_m \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(m + \alpha_j)^{2\widehat{\sigma}_m}} \right)^{1/2}, \quad j = 1, \dots, r. \quad (11)$$

Здесь K_m — компактное множество из определения метрики ϱ . Положим

$$R_m = C_m \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^{2\sigma_m}} \right)^{1/2}, \quad \widehat{R}_{mj} = \widehat{C}_m \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(m + \alpha_j)^{2\widehat{\sigma}_m}} \right)^{1/2}.$$

Пусть ε — произвольное положительное число и $m \in \mathbb{N}$. Полагая $M_m = R_m 2^{m+l+1} \varepsilon^{-1}$ и $\widehat{M}_{mj} = R_{mj} 2^{m+r+1} \varepsilon^{-1}$, из неравенств (10) и (11) получаем, что для всех $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} & \limsup_{T \rightarrow \infty} \mathbb{P}((\exists j : \sup_{s \in K_m} |X_{T,n,j}(s)| > M_m) \vee (\exists j : \sup_{s \in K_m} |\widehat{X}_{T,n,j}(s)| > \widehat{M}_{mj})) \\ & \leq \sum_{j=1}^l \limsup_{T \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\sup_{s \in K_m} |X_{T,n,j}(s)| > M_m) + \sum_{j=1}^r \limsup_{T \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\sup_{s \in \widehat{K}_m} |\widehat{X}_{T,n,j}(s)| > \widehat{M}_{mj}) \\ & \leq \sum_{j=1}^l \frac{1}{M_m} \sup_{n \in \mathbb{N}} \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \sup_{s \in K_m} |L_n(s + i\tau, \chi_j)| d\tau \\ & \quad + \sum_{j=1}^r \frac{1}{\widehat{M}_{mj}} \sup_{n \in \mathbb{N}} \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \sup_{s \in K_m} |L_n(\lambda_j, \alpha_j, s + i\tau)| d\tau \\ & \leq \sum_{j=1}^l \frac{R_m}{M_m} + \sum_{j=1}^r \frac{\widehat{R}_{mj}}{\widehat{M}_{mj}} = \frac{\varepsilon}{2^{m+1}} + \frac{\varepsilon}{2^{m+1}} = \frac{\varepsilon}{2^m}. \end{aligned}$$

Отсюда, принимая во внимание соотношение (7), находим, что для всех $n \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{P}((\exists j : \sup_{s \in K_m} |X_{n,j}(s)| > M_m) \vee (\exists j : \sup_{s \in K_m} |\widehat{X}_{n,j}(s)| > \widehat{M}_{mj})) \leq \frac{\varepsilon}{2^m}. \tag{12}$$

Определим множество

$$\begin{aligned} H_\varepsilon^{l+r} = \{ & (g_1, \dots, g_l, \hat{g}_1, \dots, \hat{g}_r) \in H^{l+r}(D) : \sup_{s \in K_m} |g_{j_1}(s)| \leq M_m, \\ & j_1 = 1, \dots, l, \sup_{s \in K_m} |g_j(s)| \leq \widehat{M}_{mj}, j = 1, \dots, r, m \in \mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

Тогда H_ε^{l+r} является компактным множеством в пространстве $H^{l+r}(D)$. Кроме того, ввиду (12) для всех $n \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{P}(\underline{X}_n(s) \in H_\varepsilon^{l+r}) \geq 1 - \varepsilon \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m} = 1 - \varepsilon.$$

Отсюда и из определения случайного элемента $\underline{X}_n(s)$ имеем, что для всех $n \in \mathbb{N}$

$$P_n(H_\varepsilon^{l+r}) \geq 1 - \varepsilon.$$

Последнее неравенство показывает, что семейство вероятностных мер $\{P_n : n \in \mathbb{N}\}$ плотное (определение плотности см. в [26]). Следовательно, по теореме Прохорова [26] оно относительно компактно. Поэтому существует подпоследовательность $\{P_{n_k}\} \subset \{P_n\}$ такая, что P_{n_k} при $k \rightarrow \infty$ слабо сходится к некоторой мере P на $(H^{l+r}(D), \mathcal{B}(H^{l+r}(D)))$. Это можно записать соотношением

$$\underline{X}_{n_k}(s) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}} P. \tag{13}$$

На вероятностном пространстве $(\Omega_0, \mathcal{B}(\Omega_0), \mathbb{P})$ определим еще один $H^{l+r}(D)$ -значный случайный элемент $\underline{X}_T(s)$ формулой

$$\underline{X}_T(s) = \underline{L}(s + i\theta T, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}).$$

Тогда из первого утверждения леммы 6 вытекает, что для всякого $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \limsup_{T \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\underline{\varrho}(\underline{X}_T(s), \underline{X}_{T,n}(s)) \geq \varepsilon) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : \underline{\varrho}(\underline{L}(s + i\tau, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}), \underline{L}_n(s + i\tau, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})) \geq \varepsilon\} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T\varepsilon} \int_0^T \underline{\varrho}(\underline{L}(s + i\tau, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}), \underline{L}_n(s + i\tau, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})) d\tau = 0. \end{aligned}$$

Последнее равенство и соотношения (7) и (13) показывают, что выполнены все условия теоремы 4.2 из [26]. Следовательно,

$$\underline{X}_T(s) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{D}} P, \quad (14)$$

что эквивалентно слабой сходимости меры P_T при $T \rightarrow \infty$ к мере P .

Остается доказать, что мера $P_{T,\omega}$ при $T \rightarrow \infty$ также слабо сходится к P . Сначала замечаем, что соотношение (14) показывает, что мера P не зависит от выбора последовательности $\{P_{n_k}\}$. Отсюда и относительной компактности семейства $\{P_n\}$ вытекает, что

$$\underline{X}_n(s) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{D}} P. \quad (15)$$

На вероятностном пространстве $(\Omega_0, \mathcal{B}(\Omega_0), \mathbb{P})$ определим $H^{l+r}(D)$ -значные случайные элементы

$$\begin{aligned} \underline{X}_{T,n,\omega}(s) &= \underline{L}_n(s + i\theta T, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}), \\ \underline{X}_{T,\omega}(s) &= \underline{L}(s + i\theta T, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}). \end{aligned}$$

Повторяя вышеприведенные рассуждения для случайных элементов $\underline{X}_{T,n,\omega}(s)$ и $\underline{X}_{T,\omega}(s)$ и применяя леммы 5 и 6, а также соотношение (15), без труда получаем, что мера $P_{T,\omega}$ при $T \rightarrow \infty$ также слабо сходится к P .

Теорема 3 будет доказана, если покажем, что предельная мера P в лемме 7 совпадает с распределением $P_{\underline{L}}$ случайного элемента $\underline{L}(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda})$. Для этой цели применим некоторые элементы эргодической теории. Пусть для $\tau \in \mathbb{R}$

$$\underline{a}_\tau = ((p^{-i\tau} : p \in \mathcal{P}), ((m + \alpha_1)^{-i\tau} : m \in \mathbb{N}_0), \dots, ((m + \alpha_r)^{-i\tau} : m \in \mathbb{N}_0)).$$

Определим $\Phi_\tau(\underline{\omega}) = \underline{a}_\tau \underline{\omega}$, $\underline{\omega} \in \underline{\Omega}$. Тогда $\{\Phi_\tau : \tau \in \mathbb{R}\}$ является однопараметрической группой измеримых и сохраняющих меру преобразований на $\underline{\Omega}$. Напомним, что множество $A \in \mathcal{B}(\underline{\Omega})$ называется *инвариантным* относительно этой группы, если для всякого $\tau \in \mathbb{R}$ множества A и $\Phi_\tau(A)$ могут отличаться друг от друга только на множество нулевой \underline{m}_H меры. Группа $\{\Phi_\tau : \tau \in \mathbb{R}\}$ называется эргодической, если ее σ -поле инвариантных множеств состоит только из множеств, мера \underline{m}_H которых равна 0 и 1.

Лемма 8. *Предположим, что множество $L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ линейно независимо над \mathbb{Q} . Тогда группа $\{\Phi_\tau : \tau \in \mathbb{R}\}$ эргодична.*

Доказательство. Поскольку множество $L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ линейно независимо над \mathbb{Q} , доказательство, по существу, совпадает с доказательством леммы 7 из [28], в которой требовалась алгебраическая независимость чисел $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ над \mathbb{Q} .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 3. Берем фиксированное множество непрерывности A меры P в лемме 6. Ввиду эквивалента слабой сходимости вероятностных мер в терминах множеств непрерывности (теорема 2.1 из [26]) в силу леммы 7

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : \underline{L}(s + i\tau, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \in A\} = P(A). \quad (16)$$

На вероятностном пространстве $(\underline{\Omega}, \mathcal{B}(\underline{\Omega}), \underline{m}_H)$ определим случайную величину $X(\underline{\omega})$ формулой

$$X(\underline{\omega}) = \begin{cases} 1, & \text{если } \underline{L}(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \in A, \\ 0, & \text{если } \underline{L}(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \notin A. \end{cases}$$

Тогда для математического ожидания имеем

$$\mathbb{E}X = \int_{\underline{\Omega}} X(\underline{\omega}) d\underline{m}_H = \underline{m}_H(\underline{\omega} \in \underline{\Omega} : \underline{L}(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \in A) = P_{\underline{L}}(A). \quad (17)$$

Из леммы 8 вытекает эргодичность случайного процесса $X(\underline{\Phi}_\tau(\underline{\omega}))$. Поэтому классическая теорема Биркгофа — Хинчина (см., например, [29]) влечет за собой для почти всех $\underline{\omega} \in \underline{\Omega}$ равенство

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T X(\underline{\Phi}_\tau(\underline{\omega})) d\tau = \mathbb{E}X. \quad (18)$$

Так как из определений случайной величины X и преобразования $\underline{\Phi}_\tau$ следует, что

$$\frac{1}{T} \int_0^T X(\underline{\Phi}_\tau(\underline{\omega})) d\tau = \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : \underline{L}(s + i\tau, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \in A\},$$

учитывая равенства (17) и (18), получаем, что

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \text{mes}\{\tau \in [0, T] : \underline{L}(s + i\tau, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \in A\} = P_{\underline{L}}(A).$$

Отсюда и из (16) заключаем, что $P(A) = P_{\underline{L}}(A)$. Поскольку A — произвольное множество непрерывности меры P , последнее равенство имеет место для всех множеств непрерывности меры P . Известно, что множества непрерывности образуют определяющий класс вероятностной меры, поэтому $P(A) = P_{\underline{L}}(A)$ для всех $A \in \mathcal{B}(H^{l+r}(D))$. Теорема доказана.

3. Носитель меры $P_{\underline{L}}$

Напоминаем, что *носителем меры $P_{\underline{L}}$* называется минимальное замкнутое множество $S_{P_{\underline{L}}}$ пространства $H^{l+r}(D)$ такое, что $P_{\underline{L}}(S_{P_{\underline{L}}}) = 1$. Множество $S_{P_{\underline{L}}}$ состоит из всех таких элементов $\underline{g} \in H^{l+r}(D)$, что $P_{\underline{L}}(G) > 0$ для любой открытой окрестности G элемента \underline{g} .

Пусть

$$S = \{g \in H(D) : g(s) \neq 0 \text{ или } g(s) \equiv 0\}.$$

Лемма 9. Предположим, что χ_1, \dots, χ_l — попарно не эквивалентные характеры Дирихле, а множество $L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ линейно независимо над \mathbb{Q} . Тогда носителем меры $P_{\underline{L}}$ является множество $S^l \times H^r(D)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку пространства $H^l(D)$ и $H(D)$ сепарабельны и

$$H^{l+r}(D) = H^l(D) \times \underbrace{H(D) \times \dots \times H(D)}_r,$$

то [26]

$$\mathcal{B}(H^{l+r}(D)) = \mathcal{B}(H^l(D)) \times \underbrace{\mathcal{B}(H(D)) \times \dots \times \mathcal{B}(H(D))}_r.$$

Поэтому достаточно рассматривать меру $P_{\underline{L}}(A)$ для $A = B \times B_1 \times \dots \times B_r$, где $B \in \mathcal{B}(H^l(D))$, а $B_j \in \mathcal{B}(H(D))$, $j = 1, \dots, r$. Пусть \hat{m}_{jH} — мера Хаара на $(\hat{\Omega}_j, \mathcal{B}(\hat{\Omega}_j))$, $j = 1, \dots, r$. Тогда мера Хаара \underline{m}_H является произведением мер m_H и $\hat{m}_{1H}, \dots, \hat{m}_{rH}$. Таким образом,

$$\begin{aligned} P_{\underline{L}}(A) &= \underline{m}_H(\underline{\omega} \in \underline{\Omega} : \underline{L}(s, \underline{\omega}, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \in A) \\ &= \underline{m}_H(\underline{\omega} \in \underline{\Omega} : (L(s, \omega, \chi_1), \dots, L(s, \omega, \chi_l)) \in B, \\ &\quad L(\lambda_1, \alpha_1, s, \hat{\omega}_1) \in B_1, \dots, L(\lambda_r, \alpha_r, s, \hat{\omega}_r) \in B_r) \\ &= m_H(\omega \in \Omega : (L(s, \omega, \chi_1), \dots, L(s, \omega, \chi_l)) \in B) \\ &\quad \times \hat{m}_{1H}(\hat{\omega}_1 \in \hat{\Omega}_1 : L(\lambda_1, \alpha_1, s, \hat{\omega}_1) \in B_1) \cdots \hat{m}_{rH}(\hat{\omega}_r \in \hat{\Omega}_r : L(\lambda_r, \alpha_r, s, \hat{\omega}_r) \in B_r). \end{aligned} \quad (19)$$

Через $P_{\underline{L}}$ обозначим распределение $H^l(D)$ -значного случайного элемента $(L(s, \omega, \chi_1), \dots, L(s, \omega, \chi_l))$. Так как характеры Дирихле χ_1, \dots, χ_l попарно не эквивалентны, носителем меры $P_{\underline{L}}$ является множество S^l [16], т. е. S^l — минимальное замкнутое подмножество пространства $H^l(D)$ такое, что

$$m_H(\omega \in \Omega : (L(s, \omega, \chi_1), \dots, L(s, \omega, \chi_l)) \in S^l) = 1. \quad (20)$$

Так как множество $L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$ линейно независимо над \mathbb{Q} , множества $L(\alpha_1), \dots, L(\alpha_r)$ также линейно независимы над \mathbb{Q} . Отсюда и из [10] получаем, что носителем меры

$$P_{L_j}(B_j) = \hat{m}_{jH}(\hat{\omega}_j \in \hat{\Omega}_j : L(\lambda_j, \alpha_j, s, \hat{\omega}_j) \in B_j), \quad B_j \in \mathcal{B}(H(D)),$$

$j = 1, \dots, r$, является все пространство $H(D)$, т. е. $H(D)$ — минимальное замкнутое множество в пространстве $H(D)$ такое, что

$$\hat{m}_{jH}(\hat{\omega} \in \hat{\Omega}_j : L(\lambda_j, \alpha_j, s, \hat{\omega}_j) \in H(D)) = 1, \quad j = 1, \dots, r.$$

Отсюда в силу (20) и (19) получаем утверждение теоремы.

4. Доказательство теоремы универсальности

Кроме теорем 3 и 9, доказательство теоремы 1 использует известную теорему Мергеляна о приближении аналитических функций многочленами. Ради удобства сформулируем версию этой теоремы в виде следующей леммы.

Лемма 10. Пусть K — компактное подмножество на комплексной плоскости, обладающее связным дополнением, а $f(s)$ — непрерывная на K и аналитическая внутри K функция. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ существует такой многочлен $p(s)$, что

$$\sup_{s \in K} |f(s) - p(s)| < \varepsilon.$$

Доказательство леммы содержится в [30, 31].

Доказательство теоремы 1. В силу леммы 10 найдутся такие многочлены $p_1(s), \dots, p_l(s)$ и $\hat{p}_1(s), \dots, \hat{p}_r(s)$, что

$$\sup_{1 \leq j \leq l} \sup_{s \in K_j} |f_j(s) - e^{p_j(s)}| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad (21)$$

$$\sup_{1 \leq j \leq r} \sup_{s \in \hat{K}_j} |\hat{f}_j(s) - \hat{p}_j(s)| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (22)$$

Определим множество

$$G = \left\{ (g_1, \dots, g_l, \hat{g}_1, \dots, \hat{g}_r) \in H^{l+r}(D) : \sup_{1 \leq j \leq l} \sup_{s \in K_j} |g_j(s) - e^{p_j(s)}| < \frac{\varepsilon}{2}, \right. \\ \left. \sup_{1 \leq j \leq r} \sup_{s \in \hat{K}_j} |\hat{g}_j(s) - \hat{p}_j(s)| < \frac{\varepsilon}{2} \right\}.$$

Тогда G — открытое множество в $H^{l+r}(D)$. Кроме того, в силу теоремы 9 набор функций $(e^{p_1(s)}, \dots, e^{p_l(s)}, \hat{p}_1(s), \dots, \hat{p}_r(s)) \in H^{l+r}(D)$ является элементом носителя меры $P_{\underline{L}}$. Поэтому $P_{\underline{L}}(G) > 0$. Отсюда, из теоремы 3 и эквивалента слабой сходимости вероятностных мер в терминах открытых множеств (теорема 2.1 из [26]) следует, что

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \text{mes} \{ \tau \in [0, T] : \underline{L}(s + i\tau, \underline{\chi}, \underline{\alpha}, \underline{\lambda}) \in G \} \geq P(G) > 0.$$

Используя определение множества G , получаем неравенство

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \text{mes} \left\{ \tau \in [0, T] : \sup_{1 \leq j \leq l} \sup_{s \in K_j} |L(s + i\tau, \chi_j) - e^{p_j(s)}| < \frac{\varepsilon}{2}, \right. \\ \left. \sup_{1 \leq j \leq r} \sup_{s \in \hat{K}_j} |L(\lambda_j, \alpha_j, s + i\tau) - \hat{p}_j(s)| < \frac{\varepsilon}{2} \right\} > 0. \quad (23)$$

Из (21) и (22) находим, что

$$\left\{ \tau \in [0, T] : \sup_{1 \leq j \leq l} \sup_{s \in K_j} |L(s + i\tau, \chi_j) - e^{p_j(s)}| < \frac{\varepsilon}{2}, \right. \\ \left. \sup_{1 \leq j \leq r} \sup_{s \in \hat{K}_j} |L(\lambda_j, \alpha_j, s + i\tau) - \hat{p}_j(s)| < \frac{\varepsilon}{2} \right\} \\ \subset \{ \tau \in [0, T] : \sup_{1 \leq j \leq l} \sup_{s \in K_j} |L(s + i\tau, \chi_j) - f_j(s)| < \varepsilon, \\ \sup_{1 \leq j \leq r} \sup_{s \in \hat{K}_j} |L(\lambda_j, \alpha_j, s + i\tau) - \hat{f}_j(s)| < \varepsilon \}.$$

Отсюда и из (23) приходим к неравенству теоремы 1.

Следствие 2 вытекает из утверждения теоремы 1, так как алгебраическая независимость над \mathbb{Q} чисел $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ влечет за собой линейную независимость множества $L(\mathcal{P}, \alpha_1, \dots, \alpha_r)$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Прахар К. Распределение простых чисел. М.: Мир, 1967.
2. Карацуба А. А. Основы аналитической теории чисел. М.: Наука, 1983.
3. Чандрасекхаран К. Арифметические функции. М.: Наука, 1975.
4. Давенпорт Г. Мультипликативная теория чисел. М.: Наука, 1971.
5. Iwaniec H., Kowalski E. Analytic number theory. Providence, RI: Amer. Math. Soc., 2004. (Amer. Math. Soc. Colloq. Publ.; V. 53).
6. Lipschitz R. Untersuchung einer aus vier Elementen gebildeten Reihe // J. Reine Angew. 1857. V. 54. P. 313–328.
7. Lerch M. Note sur la fonction $\mathcal{R}(w, x, s) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{2k\pi i}}{(w+k)^s}$ // Acta Math. 1887. V. 11. P. 19–24.
8. Lagarias J. C., Li W.-Ch. W. The Lerch zeta function. I. Zeta integrals // Forum Math. 2012. V. 24. P. 1–48.
9. Lagarias J. C., Li W.-Ch. W. The Lerch zeta-function. II. Analytic continuation // Forum Math. 2012. V. 24. P. 49–84.
10. Laurinčikas A., Garunkštis R. The Lerch zeta-function. Dordrecht; Boston; London: Kluwer Acad. Publ., 2002.
11. Pál J. Zwei kleine Bemerkungen // Tohōku Math. J. 1914/15. V. 6. P. 42–43.
12. Grosse-Erdmann K.-G. Universal families and hypercyclic operators // Bull. Amer. Math. Soc. 1999. V. 36. P. 345–381.
13. Воронин С. М. Теорема об «универсальности» дзета-функции Римана // Изв. АН СССР. Сер. математика. 1975. Т. 39. С. 475–486.
14. Laurinčikas A. Limit theorems for the Riemann zeta-function. Dordrecht; Boston; London: Kluwer Acad. Publ., 1996.
15. Воронин С. М. О функциональной независимости L -функций Дирихле // Acta Arith. 1975. V. 27. P. 493–503.
16. Laurinčikas A. On joint universality of Dirichlet L -functions // Чебышевский сб. 2011. V. 12, N 1. P. 124–139.
17. Bagchi B. The statistical behaviour and universality properties of the Riemann zeta-function and other allied Dirichlet series: Ph. D Thesis. Indian Statistical Institute, Calcutta, 1981.
18. Bagchi B. A joint universality theorem for Dirichlet L -functions // Math. Z. 1982. Bd 181. S. 319–334.
19. Gonek S. M. Analytic properties of zeta and L -functions: Ph. D. Thesis. Univ. Michigan, 1979.
20. Laurinčikas A., Matsumoto K. The joint universality and the functional independence for Lerch zeta-functions // Nagoya Math. J. 2000. V. 157. P. 211–227.
21. Laurinčikas A., Matsumoto K. Joint value distribution theorems on Lerch zeta-functions. III // Anal. Prob. Methods Number Theory (Eds. Laurinčikas A., E. Manstavičius). Vilnius: TEV, 2007. P. 87–98.
22. Лауринчикас А. О совместной универсальности дзета-функций Лерха // Мат. заметки. 2010. Т. 88, № 3. С. 428–437.
23. Nakamura T. The existence and the non-existence of joint t -universality for Lerch zeta-functions // J. Number Theory. 2007. V. 125, N 2. P. 424–441.
24. Laurinčikas A. The joint universality of Hurwitz zeta-functions // Šiauliai Math. Semin. 2008. V. 3, N 11. P. 169–187.
25. Heyer H. Probability measures on locally compact groups. Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verl., 1977.
26. Биллингсли П. Сходимость вероятностных мер. М.: Наука, 1977.
27. Лауринчикас А., Шяучюнас Д. Замечания об универсальности периодической дзета-функции // Мат. заметки. 2006. Т. 80, № 4. С. 561–568.
28. Лауринчикас А. Совместная универсальность дзета-функций с периодическими коэффициентами // Изв. РАН. Сер. математика. 2010. Т. 74, № 3. С. 79–102.
29. Cramér H., Leadbetter M. R. Stationary and related stochastic processes. New York: John Wiley, 1967.

-
- 30.** Мергелян С. Н. Равномерное приближение функций комплексной переменной // Успехи мат. наук. 1952. Т. 7. С. 31–122.
- 31.** Walsh J. L. Interpolation and approximation by rational functions in the complex domain. Providence, RI: Amer. Math. Soc., 1960. (Amer. Math. Soc. Colloq. Publ.; V. 20).

Статья поступила 29 ноября 2012 г.

Лауринчикас Антанас
Вильнюсский университет,
ул. Наугардуко, 24, Вильнюс LT-03225, Литва
`antanas.laurincikas@mif.vu.lt`

Мацайтене Рената
Шяуляйский университет,
пр. Вишинскио, 19, Шяуляй LT-77156, Литва
`renata.macaitiene@mi.su.lt`